

Etiqueta UNITOX 0.25 L 11/07/22 11:00 AM

Medidas: 20 cm (ancho) x 6.5 cm (alto)

Tipo de letra: Arial (6ptos)

ET. PQUA No. -SENASAV001-0.25L

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroides.
- En caso de ingestión, **NO INDUCIR AL VÓMITO**. No administre nada por la boca a una persona inconsciente. Llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia, si es necesario.
- **Antídoto:** No existe antídoto específico

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106  
Teléf. del titular: (01) 5137200  
CISPROQUIM: 080-050-847

# UNITOX

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

#### Composición:

Alpha-cypermethrin ..... 100 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° - SENASA

#### Titular de Registro:

ARYSTA LIFESCENCE PERU S.A.C.



#### Formulador:

LAOTING YOLOO BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.

#### Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

**CONTENIDO NETO: 250 mL**

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **UNITOX** es un insecticida piretroide; actúa por contacto e ingestión y tiene la particularidad de controlar a los insectos y presenta buena residualidad.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| Cultivo | Plaga              |                              | Dosis<br>L/Ha | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|--------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         | Nombre Común       | Nombre Técnico               |               |              |              |
| Maíz    | "Gusano cogollero" | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.2           | 14           | 0.05         |

PC: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar 1 aplicación por campaña. Previa evaluación cuando se observen los primeros estadios larvales.

#### PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 48 horas después de la aplicación.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

