

[illegible]

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MAGESTO® 250 EC es un fungicida de actividad sistémica y traslaminar. Su fase de vapor brinda un control residual al incrementar la penetración del producto a sitios donde la aplicación no llega. Interfiere en la síntesis de ácidos nucleicos (adenosindeaminasa), inhibiendo la esporulación del hongo.

MÉTODO DE APLICACIÓN

MAGESTO® 250 EC se emplea diluido en agua; se preparar una premezcla con la dosis recomendada, en un tercio del volumen a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua hasta lograr una mezcla homogénea.

EQUIPO DE APLICACIÓN

MAGESTO® 250 EC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, por parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado, usando el equipo de protección personal.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
MANZANO	Oídiosis	<i>Podosphaera leucotricha</i>	0.1 - 0.2	14	0.2
VID	Oídiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.2	14	0.05

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

Gasto de agua: 600 L/Ha (Manzano), 1000 L/Ha (Vid).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **MAGESTO® 250 EC** luego de una evaluación, cuando la densidad de plaga lo justifique.

Realizar 1 aplicación por campaña considerando 1 campaña al año para los cultivos de manzano y vid.

PERÍODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

MAGESTO® 250 EC es compatible con la mayoría de los pesticidas, excepto los de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS

No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

MAGESTO
250 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Silvestre

Titular del Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.

Tel.: (01) 617-3300

Formulado por:

JIANGSU AIJIN AGROCHEMICAL CO. LTD.

N° 58 Shuangxiang Road, Hongshan

Fine-Chemical Zone, Nanjing 211511, China.

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

“Nocivo en caso de ingestión”

“Nocivo en contacto con la piel”

“Nocivo si se inhala”

“Tóxico para

organismos

acuáticos”

ATENCIÓN