Etiqueta SATELLITE 20 L.pdf 1 01/08/22
Medidas (Frontal y Detrás): 17 cm (ancho) x 15 cm (alto)
Tipo de letra: Arial Narrow (6 ptos)

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

SATELLITE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CÁPSULAS EN SUSPENSIÓN (CS)

Composición:
Pendimethalin ..... 456 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 1567 - SENASA

Titular de Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.
Jr. Caracas Nro. 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima. Teléfono (01) 5137200

Formulador:
UPL LIMITED
Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West),
Mumbai, 400 052, India.

Importador y Distribuidor:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY SAC
RUC: 20603903359
Av. Nicolás de Ayllón N° 2941 dpto.7A Z.I. El Agustino. Lima - Perú.
Telf.: (01) 644-9297. www.silvestreshanghai.com

Fecha de formulación:
No. de Lote:
CONTENIDO NETO: 20 L
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

ET. PQUA No. 1567-SENASAV006-20L

Etiqueta SATELLITE 20 L.pdf 2 01/08/22
Medidas (Frontal y Detrás): 17 cm (ancho) x 15 cm (alto)
Tipo de letra: Arial Narrow (6 ptos)

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación,
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dinitroaniline.
- En caso de intoxicación, conseguir asistencia médica y presentar la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 a 20 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagándolos. Se recomienda no volver a utilizar los lentes de contacto.
- **Nota al Médico:** este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 / Teléf. del titular: (01) 5137200 / CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos, o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **SATELLITE** es un herbicida preemergente sistémico del grupo de las dinitroanilinas que afecta la germinación de las semillas de las malezas, inhibiendo el crecimiento de brotes y raíces, causándoles la muerte.
- **SATELLITE**, se aplica con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto o completar el volumen de la aplicación.
- Calibrar el equipo previamente. Aplicar al suelo, cuando el campo se encuentre en capacidad de campo, de lo contrario realizar un riego posterior a la aplicación. Usar boquillas de abanico plano.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/ha		
ARROZ	Rabo de zorro Verdolaga Coquito Grama china	*Leptochloa fusca* *Portulaca oleracea* *Cyperus rotundus* *Sorghum halepense*	2.5	3.7	N.R	0.05
AJO	Yuyo Pata de gallina Grama dulce	*Amaranthus hybridus* *Eleusine indica* *Cynodon dactylon*	2.0 - 2.5	2.0 - 2.5	45	0.05
CEBOLLA	Verdolaga Pata de gallina Coquito	*Portulaca oleracea* *Eleusine indica* *Cyperus rotundus*	2.0 - 2.5	2.0 - 2.5	30	0.05
CAÑA DE AZÚCAR	Pata de gallina Coquito Yuyo	*Eleusine indica* *Cyperus rotundus* *Amaranthus dubius*	2.0 - 2.5	2.0 -2.5	N.R	0.05

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos N.R.: No requiere

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al suelo, cuando las malezas están en etapa de germinación.
- Realizar como máximo 1 aplicación por campaña por año.
- En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar resistencia.
- Para el cultivo de caña de azúcar "única aplicación a la siembra o trasplante".

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

SATELLITE es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se observaron síntomas de fitotoxicidad cuando fue aplicado en el cultivo y a la dosis recomendada.
"La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos".

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

ET. PQUA No. 1567-SENASA V006-20L