

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia

- SAMU: 106
- SINERIA PERU S.A.C. +51 945138049

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano, en las mañanas o muy en las tardes o noches. Evitar la deriva por el viento.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 01 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranos del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

KOBE SC

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Extracto de planta de *Rheum officinale* 100 g/L
Aditivos C.S.D.

Reg. N° 0158 – SENASA – PBA - EV

Titular del Registro: SINERIA PERU S.A.C.

Av. Caminos del Inca 131 Int. 204 Urb. Chacarilla del Estanque
Santiago de Surco, Lima – Perú
Teléfono +51 945138049 / www.sineria.com

Formulador:

SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD.

Ayias Fylaxeos & Zinonos Rossidi 2, 2/F, P.C.3082,
Limassol, Cyprus.
Tel. +357 25 733310 / www.sineria.com

Importado y

Distribuido por:

O'AGTEN

AG TEN E.I.R.L.

Urb. Laguna del Chipe A5 II Etapa, Int.301, Piura - Perú.
Correo: ventas@agtendelperu.com / www.agtendelperu.com

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 1L, 5L, 20L y 200 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

KOBESC es un fungicida protector y de contacto. No solo ataca el patógeno directamente, sino que activa el sistema inmunológico de la planta provocando la Resistencia Sistémica Adquirida (RSA) de la planta atacada e introduciendo el modo de resistencia sistémica de la planta (RSA). Esto hace que las plantas generen su propio mecanismo de defensa contra los patógenos. En consecuencia, **KOBE SC** permite la inhibición del metabolismo de las células del hongo y de este modo impide el crecimiento del micelio (células del hongo) sobre la superficie de la planta.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada de **KOBE SC** en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total.

KOBE SC debe ser aplicado cubriendo bien las partes de la planta, especialmente las hojas por la parte superior y la parte inferior.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/Cil. 200L	L/Ha		
Arándano	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	2.5	N.A.	N.A.
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.40	-	N.A.	N.A.

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) P.C.: Período de carencia (días)

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Puede ser utilizado de manera preventiva o al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. Considerar hasta 02 aplicaciones por campaña y 01 campaña por año para arándano y vid.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda reingresar al área tratada después de 12 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

KOBE SC es incompatible con agentes oxidantes, medios no acuosos, medios ácidos y alcalinos fuertes.

Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad física antes de mezclar con cualquier otro producto.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

