Pantone Black | Pantone 293 | Pantone 2747 | Pantone 347 | Pantone Cyan

26 x 15 cms

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Nocivo en caso de ingestión.
- Nocivo en contacto con la piel.
- Nocivo si se inhala.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área de impregnación y tratamiento de las semillas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Cyantraniliprole: amidas antranílicas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado: brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú: (1) 434-5600, CISPROQUIM: 0800-50-847.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas
- Nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración
- No aplicar en presencia de polinizadores
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atrae polinizadores.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con el producto ó restos de la aplicación ó sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales ó en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.

FORTENZA® 600 FS

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLA (FS)

Composición

Cyantraniliprole	.....	600 g/L
Aditivos	.....	c.s.p. 1 L

PQUA N°..... - SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú
Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: 434-5600

syngenta®

Formulado por:
SYNGENTA CROP PROTECTION, LLC
Estados Unidos

Importado y Distribuido por:
Syngenta Crop Protection S.A
Sucursal Perú

Contenido Neto: 1 Litro

N° de Lote:
Fecha de formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo de acción: Cyantraniliprole tiene actividad sistémica y se mueven hacia arriba en la planta a través del xilema.
Mecanismo de acción: Cyantraniliprole tiene la capacidad de imitar a la rianodina y activar los receptores de rianodina del insecto.
Luego de ser aplicado a la semilla, es absorbido rápidamente por las raíces y se mueve hacia arriba en la planta por el xilema. Los insectos son controlados principalmente por ingestión. Imita a la rianodina y activa los receptores de rianodina de los insectos.

Modo de Empleo: Una aplicación por impregnación a la semilla previa a la siembra. La impregnación puede hacerse con una máquina tratadora de semillas mecánica o manual, o con una bolsa plástica. Ponga la cantidad de producto a usar en un recipiente limpio y agregue la cantidad de agua necesaria para diluirlo. Se recomienda 12 - 15 mL de mezcla **Fortenza® 600 FS** + Agua para tratar 1 kg de semilla. Para la siembra de semilla tratada no use agentes secantes y lubricantes que aumentan la producción de polvo (como talco o grafito).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
Maíz *(Zea mays)*	Gusano cogollero *(Spodoptera frugiperda)*	1.2 - 1.6 cc/kg de semilla	N.A.	N.A.

PC: Periodo de Carencia, LMR: Límite Máximo de Residuos
NA: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: debe ser aplicado a la semilla antes de la siembra de maíz.

PERIODO DE REINGRESO (REENTRADA): No aplica, el tratamiento se da a la semilla del maíz.
COMPATIBILIDAD: No se conocen incompatibilidades; sin embargo, antes de mezclarlo con otro producto se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

FITOTOXICIDAD: No se ha observado. Sin embargo, debido al gran número de híbridos y variedades existentes, se recomienda hacer ensayos a pequeña escala para observar la fitocompatibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORÍA TOXICOLOGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

FO 08 22 REG

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA