

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor. Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35°C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Evitar la ingestión del producto.
- Peligroso si es inhalado. Evite la respirar los vapores. No inhalar la nube de aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas +Triazoles
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente. No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.

TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU 106; SYNGENTA (01) 4345600; CISPROQUIM: 0800-50-84

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de destinado dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos flora yfauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Quadris Top

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición

Azoxystrobin 200 g/L

Difenoconazol 125 g/L

Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 3163 - SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguín 335, Of. 808. Urb. Los Granados,
Santiago de Surco. Lima, Perú
RUC 20501511740

Importado y Distribuido por:

TQC
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima- Perú.
Telf:: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:

Syngenta S.A.
Carretera a Mamonal, Km 6.0
Cartagena, Colombia

syngenta®

Contenido Neto: 200 Litros

Lote N°.:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Modo y mecanismo de acción: Azoxystrobin pertenece al Grupo 11 de la clasificación por modo de acción de los fungicidas de FRAC. Tiene acción sistémica. Inhibe la respiración celular al impedir la transferencia de electrones entre el citocromo b y c1 evitando así la formación de energía (ATP) necesaria para el crecimiento y desarrollo del hongo. Es un potente inhibidor de la germinación de esporas y de los estadios iniciales en el desarrollo del patógeno. Difenoconazole pertenece al Grupo 3 de FRAC. Es un compuesto sistémico local de rápida penetración y fuerte movimiento translaminar. Actúa sobre el hongo patógeno durante la penetración y la formación de haustorios. Detiene el desarrollo de los hongos al interferir con la síntesis de esteroides en las membranas celulares.
Modo de empleo: Aplicar con equipo terrestre (manual, atomizadora, estacionaria o tractorizado) que cuente con boquillas adecuadas. Se debe calibrar el equipo y el ritmo de aplicación.

"Consulte con un Ingeniero Agronomo"					
Cultivo	Enfermedad		Dosis		P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	ml/200 l	mL/ha	
Arándanos	Alternariosis	Alternaria tenuissima		500	7
	Quemado	Pyricularia grisea		500	30
Arroz	Rhizoctoniasis	Rhizoctonia solani	350 - 400		*5/**3
	Quemado	Stemphylin vesicarium		250 - 300	7
Cebolla	Roya	Puccinia asparagi	150 - 200	450 - 600	*1/**0.1
	Mancha purpura	Stemphylin vesicarium		230 - 300	30
Esparrago	Cercosporiasis	Cercospora asparagi	200 - 300		*0.01/**0.03
	Mancha del asfalto	Phyllachora maydis		400 - 450	70
Maiz	Oidium	Oidium mangiferae		400 - 500	25
Mango	Oidium	Leveillula taurica	150 - 200	300 - 400	*3/**0.8
Pimiento	Pudricion gris	Botrytis cinerea		300	7
Vid	Oidium	Uncinula necator		500	*2/**3
Alcachofa	Oidiun	Leveillula taurica		350 - 400	30
	Alternariosis	Alternaria solani		450 - 500	30
Papa	Rhizoctoniasis	Rhizoctonia solani		1000 ¹	*7/**4
Tomate	Alternaria	Alternaria passiflora		500	7
Palto	Pudrición peduncular	Lasidiopodia theobromae	100 - 120	500 - 600	21
Mandarina	Mancha negra	Alternaria alternata	100	500	0
Tangelo	Mancha negra	Alternaria alternata	100	500	0
Cacao	Moniliasis del Cacao	Moniliophthora roreri		500	30

P.C.: Período de CarenciaL.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón
*Azoxystrobin ** Difenoconazole 1 Cubrir el tubérculo semilla de papa en aplicación a fondo de surco
Nota: Para cultivos de exportación dar aplicación a los requerimientos exigibles según el país de destino

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION: Realizar dos aplicaciones para mandarina y tangelo y una para el resto de cultivos por campaña/año. Debe ser aplicado de forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Quadris Top puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados.
FITOTOXICIDAD: Siempre que Quadris Top se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad a la dosis recomendada.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

UN 3082

SUSTANCIA PELIGROSA
PARA EL AMBIENTE,
LIQUIDO, N.O.S.,
(AZOXISTROBINA Y
DIFENOCONAZOL)

