

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor. Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35°C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Evitar la ingestión del producto.
- Peligroso si es inhalado. Evite la respiración de los vapores. No inhalar la nube de aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Estrobilurinas+Triazoles
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito. Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** SAMU: 106; Syngenta Perú: (01)434-5605; CISPROQUIM: 080050847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# Quadris Top

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

**Composición**

Azoxystrobin ..... 200 g/L  
 Difenconazol ..... 125 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N°

**Titular del Registro:**

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú  
 Av. Manuel Olguín 335, Of. 808. Urb. Los Granados,  
 Santiago de Surco. Lima, Perú  
 RUC 20501511740

**Importado y Distribuido por:**

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.  
 Calle René Descartes No 311  
 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.  
 Lima - Perú.  
 Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
 R.U.C. N° 20307150981

**Formulado por:**

Syngenta Grangemouth Works  
 Earls Road  
 Grangemouth  
 Strirlingshire FK3 8XG  
 Scotland, Reino Unido

**Contenido Neto: 1000 Litros**

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

Los nombres de producto que contengan ® o ™,  
 El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME  
 Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- Quadris Top es la combinación de dos fungicidas, azoxystrobin y difenoconazol; que le permite controlar un amplio rango de enfermedades. Quadris Top tiene actividad tanto sistémica como de contacto.
- Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Para la preparación, echar la cantidad de Quadris Top a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale de último y vuelva a agitar.
- Quadris Top puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).

"Consulte con un Ingeniero Agronomo"

Cultivo	Nombre Común	Nombre Científico	(cc/200L)	mL/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
Arándanos	Alternariosis	Alternaria tenuissima		500	14	*5/**0.1
Arroz	Quemado	Pyricularia grisea		500	30	*5/**3
	Rhizoctoniasis	Rhizoctonia solani	350 - 400			
Cebolla	Quemado	Stemphylin vesicarium		250 - 300	7	*1/**0.1
	Roya	Puccinia asparagi	150 - 200	450 - 600		
Esparrago	Mancha purpura	Stemphylin vesicarium		230 - 300	30	*0.01/**0.03
	Cercosporiasis	Cercospora asparagi	200 - 300			
Maiz	Mancha del asfalto	Phyllachora maydis		400 - 450	70	*0.02/**0.05
Mango	Oidium	Oidium mangiferae		400 - 500	25	*0.7/**0.07
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	150 - 200	300 - 400	7	*3/**0.8
Vid	Pudrición gris	Botrytis cinerea		300	7	*2/**3
	Oidium	Uncinula necator		500		
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica		350 - 400	30	*5/**1
Papa	Alternariosis	Alternaria solani		450 - 500	30	*7/**4
	Rhizoctoniasis	Rhizoctonia solani	1000'			
Tomate	Alternaria	Alternaria passiflora		500	7	*2/**2
Palto	Pudrición peduncular	Lasidiopodia theobromae	100 - 120	500 - 600	21	*2/**0.6
Mandarina	Mancha negra	Alternaria alternata	100	500	0	*15/**0.6
Tangelo	Mancha negra	Alternaria alternata	100	500	0	*15/**0.6
Cacao	Moniliasis del Cacao	Moniliophthora roleri		500	30	*0.05/**0.05

P.C.: Período de Carencia.L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón  
 \*Azoxystrobin \*\* Difenconazole 1 Cubrir el tubérculo semilla de papa en aplicación a fondo de surco

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION**

- Realizar dos aplicaciones para mandarina y tangelo y una para el resto de cultivos por campaña/año. Debe ser aplicado de forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO**

- No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

- Quadris Top puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados.


**FITOTOXICIDAD**

- La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**UN 3082**

**SUSTANCIA PELIGROSA  
 PARA EL AMBIENTE,  
 LIQUIDO, N.O.S.,  
 (AZOXISTROBINA Y  
 DIFENOCONAZOL)**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**

