

26.5 cm

Divino

10 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Alpha-cypermethrin..... 100 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° - SENASA

Grupo Químico: Piretroides

Nombre Químico:

(S)-a-ciano-3-fenoxibencil(1R,3R)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato y (R)-a-ciano-3-fenoxibencil(1S,3S)-3-(2,2-dicloro-vinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato

Grupo Químico: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃

Peso Molecular: 416 g/ml



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Amarillo claro

Olor: Típico a solvente aromático

pH: 5.5

Densidad: 0.91 - 0.92 g/ml a 20 °C

Inflamabilidad: Inflamable

Explosividad: No explosivo

TITULAR DEL REGISTRO:

INSUMOS AGRÍCOLA PERUANOS S.A.C

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono: (01) 499-7831

FORMULADO POR:

POINT INTERNATIONAL LTD.

42 St. Margarets Grove Twickenham

TW 1 1JG United Kingdom

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

HORTUS S.A

Calle Suele 270, Ate, Lima – Perú

Teléfono: (01) 7482717

RUC: 20101637221

RU N°: 141097



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración de los cultivos de sandía y tomate.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 3 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositar en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Pyrethroid insecticide.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar agua a la persona si está inconsciente.

- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

En caso de emergencias llamar a:

SAMU: 106; INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS: (01)499-7831

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



26.5 cm

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Peligroso si es inhalado.
- Evite respirar (polvo, vapor o dispersión)
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en lugares secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DIVINO 10 CE es un insecticida piretroides que actúa por contacto e ingestión a bajísima dosis, empleado en el control de lepidópteros, hemipteros y otras órdenes de insectos de importancia agrícola. Además, ofrece una persistente protección a los cultivos tratados.

DIVINO 10 CE presenta baja toxicidad para humanos y animales de sangre caliente.

Recomendamos regular el pH del agua a 5, que es el que requiere el **DIVINO 10 CE** para cumplir con sus características de control.

Sistemas de preparación y aplicación: Para su adecuada aplicación, preparar una pre-mezcla vertiendo la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo y completar el volumen de agua de aplicación. Puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres (mochila a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar cuando se observen las primeras posturas y/o larvas.

Puede hacer una segunda aplicación 7 ó 10 días después de la primera.

Número máximo de aplicaciones por campaña: 2

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación. Ingresar con equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común e incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS ml/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Alfalfa	Gusano ejército	<i>Prodenia spp.</i>	125	14	30
Algodón	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	125	14	0.2
	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	125	14	0.2
Col	Gusano de hoja	<i>Plutella spp.</i>	125	14	1
Espárrago	Gusano del follaje	<i>Heliothis virescens</i>	250	1	0.1
Frijol	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia spp.</i>	150	14	0.7
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	125	21	0.05
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100	14	0.05
Sandía	Perforador de guías	<i>Diaphania nitidalis</i>	125	14	0.2
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	125	14	0.5

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)



9.9 cm

9.9 cm