

28.5 cm

12.5 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Peligroso si es inhalado.
- Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgica en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en lugares secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Pyrethroid insecticide.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
SAMU: 106; INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C: (01) 499-7831

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración de los cultivos de sandía y tomate.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositar en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Divino  
10 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Alpha-cypermethrin..... 100 g/L  
Aditivos .....C.S.p.1 L

Reg. N° - SENASA



Titular del Registro:  
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.  
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
Santiago de Surco, Lima - Perú.  
Teléfono: (01) 499-7831  
Formulado por:  
POINT AGRO-CHINA LIMITED  
Yan Shi Town,  
Yixing Jiangsu 214217, China  
Tel: (86-510)8785 1001



Importado y distribuido por:  
HORTUS S.A.  
Calle Sucre 270, Ate,  
Lima - Perú  
Teléfono: (01) 7482717  
RUC: 20101637221  
RU N° 141097

Contenido Neto: 200L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**DIVINO 10 CE** es un insecticida piretroides que actúa por contacto e ingestión a bajísima dosis, empleado en el control de lepidópteros, hemípteros y otras órdenes de insectos de importancia agrícola. Además, ofrece una persistente protección a los cultivos tratados.

**DIVINO 10 CE** presenta baja toxicidad para humanos y animales de sangre caliente.

Recomendamos regular el pH del agua a 5, que es el que requiere el **DIVINO 10 CE** para cumplir con sus características de control.

**Sistemas de preparación y aplicación:** Para su adecuada aplicación, preparar una pre-mezcla vertiendo la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo y completar el volumen de agua de aplicación. Puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres (moñila a palanca o motor, tecomas, parihuelas, etc.). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO   | PLAGA               |                                 | DOSIS<br>ml/200L | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|
|           | NOMBRE COMÚN        | NOMBRE CIENTÍFICO               |                  |              |              |
| Alfalfa   | Gusano ejército     | <i>Prodenia spp.</i>            | 125              | 14           | 30           |
| Algodón   | Gusano rosado       | <i>Pectinophora gossypiella</i> | 125              | 14           | 0.2          |
|           | Arrebiatado         | <i>Dysdercus peruvianus</i>     | 125              | 14           | 0.2          |
| Col       | Gusano de hoja      | <i>Plutella spp.</i>            | 125              | 14           | 1            |
| Espárrago | Gusano del follaje  | <i>Heliothis virescens</i>      | 250              | 1            | 0.1          |
| Frijol    | Gusano medidor      | <i>Pseudopiusia spp</i>         | 150              | 14           | 0.7          |
| Maíz      | Cogollero           | <i>Spodoptera frugiperda</i>    | 125              | 21           | 0.05         |
| Papa      | Mosca minadora      | <i>Liriomyza huidobrensis</i>   | 100              | 14           | 0.05         |
| Sandía    | Perforador de guías | <i>Diaphania nitidalis</i>      | 125              | 14           | 0.2          |
| Tomate    | Polilla             | <i>Tuta absoluta</i>            | 125              | 14           | 0.5          |

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar cuando se observen las primeras posturas y/o larvas. Puede hacer una segunda aplicación 7 ó 10 días después de la primera. Número máximo de aplicaciones por campaña 2.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación. Ingresar con equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común e incompatible con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

