Etiqueta para envase en presentación de 1000 L
Formulador: Stoller Enterprises, Inc.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Ligeramente irritante ocular.
- No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación en ambientes abiertos o bien ventilados.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Giberelinas.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antídoto, tratar sintomáticamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
STOLLER PERÚ: 391 0388.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHO Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No permitir animales en el área de preparación.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto o envases vacíos.
- El producto no debe prepararse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

X-PAND

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS PARA USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición

Gibberelic Acid (GA_3)..... 134.0 g/L
Aditivos c.s.p. ……..... 1 L.

Reg. RCP Nº XXX – SENASA

Titular del Registro: Stoller Perú S.A.

Formulador: Stoller Enterprises, Inc.
9090 Katy Freeway, Suite 400, Houston, Texas 77024,
Estados Unidos de Norteamérica.

Importador y Distribuidor: Stoller Perú S.A.
Av. Javier Prado Oeste 757 Dpto. 1006, Magdalena del Mar.
Central telefónica: 391 0388
E-mail: ventas@stoller.com.pe
www.stoller.pe

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 1000 L

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

X-PAND es un regulador de crecimiento de acción hormonal que regula el crecimiento de las plantas; en semillas influye en la expansión celular e inducción de enzimas, dando lugar a la germinación y crecimiento inicial de la planta.
X-PAND se aplica en tratamiento a tubérculos-semillas, vía inmersión.

- Preparar la solución en un recipiente, verter la mitad del agua a emplear, agregar la dosis recomendada de X-PAND, mezclar y completar con el resto de agua. Usar recipientes con la capacidad necesaria para permitir la inmersión de los tubérculos.
- Remojar los tubérculos-semilla y sumergirlos en la solución por 10 a 20 minutos. Dejar orear para favorecer el secado y absorción de la solución.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Momento Aplicación/Función	Dosis mL / 100 L	LMR (ppm)	PC (días)
Papa	Antes de la siembra Germinador de semillas	12 – 14	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) N.A.: No aplica.
Este producto contiene aproximadamente 4.0 gramos de ingrediente activo por cada 30 mL de producto comercial.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Tratamiento tubérculo-semilla: Una aplicación.
No aplicar cuando el tubérculo-semilla haya iniciado el brotamiento.

PERIODO DE REINGRESO

12 horas.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con agentes oxidantes fuertes.
No aplique con productos que contengan fenoxaprop-p-etil como ingrediente activo.
X-PAND puede emplearse en conjunto con fitosanitarios empleados para tratamiento de semilla.

FITOTOXICIDAD

X-PAND no causa fitotoxicidad cuando es usado a la dosis indicada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

13 cm | 18 cm | 13 cm

44 cm

18 cm

Dimensiones: 440 mm ancho x 180 mm alto
(Azul Pantone 293-C)

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA