DINOFIX

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Registro PQUA N°XXX-SENASA

Titular del Registro:

Formulador:

CORPORACIÓN GREEN VALLEY S.A.C.

Calle B. N° 141. Int. 202.

Pro 9no sector San Martin de Porres

Teléfono: 044 407781

NANJING RHONQUIM CO., LTD.

N°26 Majia Street,

Nanjing Jiangsu 210009, China. Teléfono: +86 25 52621629

Fax: +86 25 83303203

Importador y distribuidor:



Contigo en tu campo

CORPORACIÓN GREEN VALLEY S.A.C.

RUC: 20492612767 Jr. Los Amancaes 377 - Dpto 101 La Molina - Lima - Perú www.cgreenvalley.com

Fecha de Formulación: N° de Lote: Contenido neto: 100 g Fecha de vencimiento:

"NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN"
"NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL"
"NOCIVO SI SE INHALA"
"CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS"



ATENCIÓN

""LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"" MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS'

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. Utilica ropa protector durante el manipule o yaplicación y para ingresar al area tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua pára consumo.
- Tener cuidado en la mánipulación del envase para evitar roturas. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoide + Fenilpirazol No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o la hoja de segundad
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y consultar a un médico. - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Aplicar respiración artificial si fuese

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 CORPORACIÓN GREEN VALLEY S.A.C.: 044 407781

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que hay contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento. Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar fos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar fos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros:
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.
 No aplicar cerca de las colimenas de las abejas, proteger las colimenas antes de la aplicación del producto.
 Aplicar solo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las adejas no estén polinizando.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DINOFIX es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión sobre los insectos.
DINOFIX es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión sobre los insectos.
Dinoficulars, que actúa como un agonista de receptores nicotínicos de acetilicolina de insectos jo que afecta la sinagas en el sistema nervioso central del insecto, y también Figronil, que actúa mediante el biloqueo del efecto del neurotransmisor Acido y amino butírico (GABA), el principal neurotransmisor inhibidor en insectos.

DINOFIX puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la DINOTA puede ser aplicado con cuaquer equipo conventada entesse (nocimis a palanca o moior, parindeias, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre calibrado. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumende lagua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre cientifico	Kg/200L	Kg/Ha	(días)	(ppm)
Espárrago	"Mosquilla de los brotes"	Prodiplosis longifila	0.1- 0.2	0.325- 0.65	21	0.01 (a) 0.005 (b)

L.M.R = Límite máximo de residuos (a) Dinotefuran (b) Fipronil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: El momento para realizar la aplicación estará determinado por la evaluación del campo en la que se determine que hay riesgo de daña económico al cultivo. Se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, con una campaña por año, intervale orter aplicaciones: 1º daís.

PERIODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante 48 horas después de la aplicación. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo,

COMPATIBILIDAD: DINO EIX es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, realizar

una prueba de confrabibilidad.

FITOTOXICIDAD: DINOFIX no estitutóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la eliqueta.

RESPONSABILIDAD: CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiquat a que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usay maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuniquese con el titular del registro con el distribución del producto.



anlicación

















