

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- El producto es de CUIDADO, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Arylpicolinato; Ariloxifenoxipropionate.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TÉLFONOS DE EMERGENCIA:** SAMU: 106, CISPROQUIM: 080-050-847, Corteva Agriscience Perú SAC: 4214811

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Rextigate™

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Florpyrauxifen-benzyl ..... | 12 g/L    |
| Cyhalofop-butyl .....       | 160 g/L   |
| Aditivo .....               | c.s.p. 1L |

**Reg PQA N°**

**Titular del Registro:** Corteva Agriscience Perú S.A.C.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.  
Urbanización Club Golf Los Incas. Santiago de Surco, Lima, Perú.

**FORMULADO POR:**

**Corteva Agriscience LLC.**  
9330 Zionsville Road  
Indianapolis, IN 46268  
EEUU.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Farmex S.A.**  
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - Perú  
Tel: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410  
www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 1 Litro.**

**LOTE No.:**

**FECHA DE FORMULACIÓN:**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

© ™ Marcas Registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva.

##### 2211

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** Rextigate™ es un herbicida sistémico post-emergente controla malezas gramíneas, ciperáceas y hojas anchas de importancia económica presentes en el cultivo de arroz. Rextigate™ ofrece una adecuada selectividad al cultivo tanto en sistemas de siembra directa con semilla tapada o destapada y de trasplante. Sus ingredientes activos con modo de acción diferente (Florpyrauxifen-benzil es miembro de la familia química arylpicolinato, dentro del grupo de las auxinas sintéticas y Cyhalofop butyl pertenece al grupo químico Ariloxifenoxipropionate), amplían el espectro de control y son una herramienta importante para el manejo de resistencia.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| Cultivo | Plaga          |                         | DOSIS<br>L/ha(*) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)                          |
|---------|----------------|-------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|
|         | Nombre común   | Nombre científico       |                  |              |                                       |
| ARROZ   | Cebadilla      | Echinochloa colona      | 1.8 a 2.0        | 60           | 0.02 <sup>1</sup><br>0.4 <sup>2</sup> |
|         | Moco de pavo   | Echinochloa crus-galli  |                  |              |                                       |
|         | Coquito        | Cyperus difformis       |                  |              |                                       |
|         | Lechera        | Cyperus esculentus      |                  |              |                                       |
|         | Oreja de ratón | Heteranthera reniformis |                  |              |                                       |
|         | Grama          | Leptochloa univervia    |                  |              |                                       |
|         | Verdolaga      | Portulaca oleracea      |                  |              |                                       |
|         | Pasto bermuda  | Cynodon dactylon        |                  |              |                                       |
|         |                |                         |                  |              |                                       |
|         |                |                         |                  |              |                                       |

(\*)Gasto de agua 230 L/ha

<sup>1</sup> Florpyrauxifen-Benzyl

<sup>2</sup> Cyhalofop-butyl

**FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicación de Rextigate™ en maleza post-emergente temprana en malezas con 2 a 4 hojas y 5 a 10 cm de altura; en etapa de macollamiento del cultivo de arroz (formación de nuevos tallos en forma progresiva, durante el estado vegetativo), aproximadamente a los 22 días después del trasplante.

Realizar una aplicación por campaña, una campaña por año.

Realizar calibración de equipos antes de la aplicación.

Manejo de resistencia: -Rextigate™ contiene los ingredientes activos Florpyrauxifen-benzil (GRUPO HRAC 4) y Cyhalofop-butyl (GRUPO HRAC 1). -No se recomienda usar únicamente Rextigate™ u otros herbicidas del GRUPO 4, ni del GRUPO 1, para controlar la misma maleza durante toda la temporada. -Realice una aplicación por ciclo de cultivo y asegúrese de mantener un intervalo de 7 días con la aplicación de cualquier otro herbicida. Asegúrese que Rextigate™ sea el primer herbicida postemergente que se aplique en el ciclo. -Se recomienda rotar las aplicaciones con productos que tengan diferentes modos de acción.

En caso de realizar mezclas de tanque, se recomienda hacerlo con productos de diferente