

ETIQUETA BESTAR 200 SL x 1L - 28.7cm x 15cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
ATENCIÓN

- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Ácido fosfónico.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléf. Emergencia:
SAMU: 106
INFOSALUD: 113
L&M Servicios Agrícolas Integrales SAC: (+51-01) 382 - 4874

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- "Nocivo para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en la área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin".

BESTAR

200 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glufosinate ammonium 200 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:

L&M Servicios Agrícolas Integrales SAC
Av. República de Panamá 3418 Of 301 Torre Barlovento,
San Isidro, Lima
Teléfono: (+51-1) 382 - 4874 www.seragro.net

FORMULADOR:

ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.
Xinanjiang, Jiande, Zhejiang,
311600, China
Teléfono: (+86) 571 - 87220468
wynca_info@wynca.cn

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

1 L

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **BESTAR 200 SL** es un herbicida de contacto, no selectivo. Puede ser aplicado mediante aplicación foliar dirigido al follaje de la maleza. Utilizado para el control de malezas anuales y perennes.

- Realizar una pre mezcla y vaciar al tanque de preparación, previamente llenado a la mitad, luego completar con agua y remover hasta obtener una mezcla homogénea.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Palto	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>	1.5 - 2.0	31	0.1
	"Capulí cimarrón"	<i>Nicandra physalodes</i>			
	"Gramma china"	<i>Sorghum halepense</i>			

PC: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **BESTAR 200 SL** en post-emergencia de las malezas cuando se encuentren en etapa inicial de desarrollo.
Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y por año.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BESTAR 200 SL es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo a las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

