

Medidas: Ancho 20cm, Alto: 15cm

HOJA INFORMATIVA

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



SEMIOQUÍMICO

FEROMONA AGRÍCOLA

EMISOR DE VAPORES -VP

Composición:

Rhynchopherol : 423.7 g/kg

Reg. N° 0166-SENASA-PBA-SQ

Título de Registro, Importado y Distribuido por: GRUPO KAMPU PERÚ S.A.C.
Av. Manuel Olguín 335 Of 904 Urb. Monterrico chico (Centro empresarial Link Tower)
Santiago de Surco, Lima - Perú. Tel.: (01) 7142163/955744557.

Formulado por: CHEM TICA INTERNACIONAL S.A.
Valencia, 100 m E&300m S from Industrial park Zeta, Santo Domingo, Heredia Costa Rica

CARA



Nombre común: Rhynchopherol

Nombre químico: 6-metilhept-2-en-4-ol

Fórmula estructural:

Fórmula empírica: C₁₈H₃₆O

Peso molecular: 128.21 g/mol

Propiedades Físicas y químicas:

Apariencia: Burbuja de membrana polimérica semipermeable

Capacidad-material-tipo: Bolsa de aluminio conteniendo 10 señuelos.



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE
USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto.
- Almacenar y transportar en su envase original, herméticamente cerrado y refrigerado a temperatura menor a 0°C, bajo estas condiciones se puede almacenar por dos años.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes, ni sustancias que emitan olores para preservar la feromona.
- Lavarse bien las manos con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber o usar el baño.
- Evitar condiciones de altas temperaturas.
- Debe emplearse siempre guantes en su manipulación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión: Si la persona está consciente lavar la boca con copiosas cantidades de agua por al menos quince minutos. Obtener asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua por al menos 15 minutos.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Separarse los párpados con los dedos mientras se enjuaga.
- Inhalación: Respirar aire fresco. Obtener asistencia médica si hay signos graves.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU:106

GRUPO KAMPU PERÚ: (01) 7142163/955744557

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de acabado el efecto de la feromona, entréguelo o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.



HOJA INFORMATIVA

Medidas: Ancho 20cm, Alto: 15cm

CONTRA
CARA

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"		LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"	
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua. - No permitir animales en el área tratada.		FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN Aplicar previa evaluación de la plaga o cada vez que haya presencia de la plaga en campo. LUDAOK-RHYNCO tiene una duración de 3 meses en el campo, dependiendo de las condiciones medioambientales de la zona, por lo que se recomienda realizar el cambio de la trampa.	
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO - LUDAOK-RHYNCO es una feromona sintética (Rhynchopherol 423.7 g/kg) usado para trampeo masivo de los machos y hembras del "Gorgojo de la palma" <i>Rhynchophorus palmarum</i>. - LUDAOK-RHYNCO, se usa colocando dentro de una trampa que contiene cebo a base de melaza y agua en proporción 1:1 para atraer a los adultos de machos y hembras de la plaga y estos sean capturados, esta trampa puede durar 3 meses en el campo que dependerá de las condiciones agroclimáticas de la zona. - Almacenamiento: condiciones a temperatura menor a 0°C tiene una duración de 2 años, en condiciones de temperatura ambiente tiene una duración 6 meses, en caso de estar en refrigeración (2-5°C): 1 año.		PERIODO DE REINGRESO No aplica, una vez instalado en el campo se puede reingresar sin restricciones.	
		COMPATIBILIDAD No aplica	
		FITOTOXICIDAD LUDAOK-RHYNCO, no es fitotóxico al cultivo por cuanto solo tiene efecto en la plaga	
		EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: Ninguna	
		VARIEDADES SUSCEPTIBLES: Ninguna	
		RESPONSABILIDAD CIVIL El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con distribuidor del producto.	

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Palma aceitera	Gorgojo de la palma	<i>Rhynchophorus palmarum</i>	2 trampas/5 ha	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia (días) N.A.: No aplica
LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

PRECAUCIÓN

