

164 mm alto x 145.0 mm largo

**EXTRACTO VEGETAL****FUNGICIDA - INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA****CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)****Composición:**

Aldehído cinámico.....238 g/L

Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. N° 0165-SENASA-PBA - EV

Titular de Registro: AGRILAB PERÚ S.R.L.
 Jirón Sáenz Peña 355. Dpto. 105
 Magdalena del Mar. Lima - Perú.
 Teléfono: (01) 363-8659

Formulado por: SEIPASA S.A.
 C/ Almudevar N° 2, 22240 Tardienta,
 Huesca - España.
 Tel.: +34 962 541 163



Fecha de formulación:

N° de lote:

Contenido Neto: 10 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO**NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****PRECAUCIÓN**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, secos y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- Guarde el producto en un lugar seguro y bajo llave.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación: llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel y los ojos: es suficiente con lavarse utilizando agua limpia.
- En caso de ingestión: no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos, es suficiente con beber abundante agua. Consiga atención médica y muéstrela la etiqueta.
- Nota al médico: DL50 oral aguda > 5000 mg/kg
DL50 dermal aguda > 2000 mg/kg

- Antídoto: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfono de Emergencia:

SAMU: 106.

AGRILAB PERÚ SRL: (01)3638659

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- El producto es biodegradable, no es un contaminante del ambiente.
- El producto no es tóxico para organismos acuáticos.
- No lavar los envases ni equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SEICAN es un insecticida - acaricida derivado de la canela (*Cinnamomum verum*) que actúa por contacto. Contiene sustancias naturales que causan mortalidad, repelencia y disuasión de la alimentación de los insectos.

Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad del tanque de aplicación, luego agregar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palto	Araña marrón	<i>Oligonychus punicea</i>	0.3 - 0.5	N.A.	N.A.
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.4 - 0.5	N.A.	N.A.
Vid	Oidium	<i>Erisiphe necator</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia en días.**LMR:** Límite máximo de residuo en ppm.**N.A.:** No aplica por ser un producto biológico.**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

En el cultivo de palto se recomienda realizar un máximo de 5 aplicaciones por campaña en un intervalo de 7-10 días. Iniciar las aplicaciones con la aparición de los primeros ácaros desde el inicio del desarrollo vegetativo hasta la cosecha.

En la vid se recomienda realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña cada 7-10 días, iniciando las aplicaciones con la aparición de los primeros insectos. **SEICAN** se puede aplicar durante toda la campaña de la vid, desde la apertura de yemas hasta la cosecha.

Tanto en palto como en vid es recomendable el uso de la dosis baja cuando haya una baja infestación y el uso de la dosis alta cuando haya una elevada presencia de individuos, estableciendo una estrategia de manejo integrado que reduzca el riesgo de aparición de resistencias.

PERIODO DE REINGRESO: 4 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

