

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREVAIL-P es un insecticida a base de aceite de cítrico, que contiene D-Limonene, actúa por contacto sobre la plaga, interfiriendo la cutícula, con efecto detergente disolviendo los segmentos blandos, dañando la integridad y permeabilidad de la epicutícula, además de bloquear los espiráculos de la plaga-objetivo.

Para la preparación verter las dosis recomendada de **PREVAIL-P** a utilizar, en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien y completar la cantidad de agua. Usar agua limpia y a pH 5.5 a 6.5.

PREVAIL-P, puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación y ante la presencia de la plaga. Se recomienda 2 aplicaciones / campaña, considerando un intervalo de 7 días.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo, hasta después de 24 horas de haber aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

PREVAIL-P

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Extracto de cítricos
(contiene *D-limonene*).....5 %
Aditivos.....c.s.p. 100 %

Reg. N° XXX-SENASA-PBA-EV

Titular de Registro:

AGRILAB PERÚ S.R.L.
Jirón Sáenz Peña 355, Dpto. 105
Magdalena del Mar, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 363-8659

Formulado por:

Sineria
SINERIA CHINA CO. LTD.
SINERIA CHINA LTD.
Huaicheng, Zhengfang Park, Kangma
Road, Huaian district, Huaian City
China.
Teléfono: +31 (0)43 2041120

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua, si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con agua fría.

- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. AGRILAB PERÚ S.A.C.: (1) 363-8659.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas de napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/200L)	(L/Ha)		
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1.25	1.875	N.A.	N.A.
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1.25	5.0	N.A.	N.A.
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.8 - 1.0	2.4 - 4.0	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuo (ppm)

N.A.: No aplica.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREVAIL-P es un insecticida a base de aceite de cítrico, que contiene D-Limonene, actúa por contacto sobre la plaga, interfiriendo la cutícula, con efecto detergente disolviendo los segmentos blandos, dañando la integridad y permeabilidad de la epicutícula, además de bloquear los espiráculos de la plaga-objetivo.

Para la preparación verter las dosis recomendada de **PREVAIL-P** a utilizar, en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien y completar la cantidad de agua. Usar agua limpia y a pH 5.5 a 6.5.

PREVAIL-P, puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación y ante la presencia de la plaga. Se recomienda 2 aplicaciones / campaña, considerando un intervalo de 7 días.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo, hasta después de 24 horas de haber aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

PREVAIL-P

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Extracto de cítricos
(contiene *D-limonene*).....5 %
Aditivos.....c.s.p. 100 %

Reg. N° XXX-SENASA-PBA-EV

Titular de Registro:

AGRILAB PERÚ S.R.L.
Jirón Sáenz Peña 355, Dpto. 105
Magdalena del Mar, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 363-8659

Formulado por:

Sinería

SINERIA CONSOLIDATED PRIVATE
LIMITED
Flat No 9C, 9th Floor, Geetanjali Apartment
8B Middleton Street, Kolkata, India WB
700071

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con agua fría.

- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. AGRILAB PERÚ S.A.C.: (1) 363-8659.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas de napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/200L)	(L/Ha)		
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1.25	1.875	N.A.	N.A.
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1.25	5.0	N.A.	N.A.
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.8 - 1.0	2.4 - 4.0	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuo (ppm)

N.A.: No aplica.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREVAIL-P es un insecticida a base de aceite de cítrico, que contiene D-Limonene, actúa por contacto sobre la plaga, interfiriendo la cutícula, con efecto detergente disolviendo los segmentos blandos, dañando la integridad y permeabilidad de la epicutícula, además de bloquear los espiráculos de la plaga-objetivo.

Para la preparación verter las dosis recomendada de **PREVAIL-P** a utilizar, en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien y completar la cantidad de agua. Usar agua limpia y a pH 5.5 a 6.5.

PREVAIL-P, puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación y ante la presencia de la plaga. Se recomienda 2 aplicaciones / campaña, considerando un intervalo de 7 días.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo, hasta después de 24 horas de haber aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

PREVAIL-P

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Extracto de cítricos
(contiene *D-limonene*).....5 %
Aditivos.....c.s.p. 100 %

Reg. N° XXX-SENASA-PBA-EV

Titular de Registro: **AGRILAB PERÚ S.R.L.**
Jirón Sáenz Peña 355, Dpto. 105
Magdalena del Mar, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 363-8659

Formulado por: **Sineria**
SINERIA EUROPE LTD.
SINERIA EUROPE LTD.
Carretera Carmona-Guadajoz,
Km 3.1, 41410.
Carmona (Sevilla - España)
Teléfono: +972-50-5287411

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con agua fría.

- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. AGRILAB PERÚ S.A.C.: (1) 363-8659.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas de napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/200L)	(L/Ha)		
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1.25	1.875	N.A.	N.A.
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1.25	5.0	N.A.	N.A.
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.8 - 1.0	2.4 - 4.0	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuo (ppm)

N.A.: No aplica.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREVAIL-P es un insecticida a base de aceite de cítrico, que contiene D-Limonene, actúa por contacto sobre la plaga, interfiriendo la cutícula, con efecto detergente disolviendo los segmentos blandos, dañando la integridad y permeabilidad de la epicutícula, además de bloquear los espiráculos de la plaga-objetivo.

Para la preparación verter las dosis recomendada de **PREVAIL-P** a utilizar, en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien y completar la cantidad de agua. Usar agua limpia y a pH 5.5 a 6.5.

PREVAIL-P, puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación y ante la presencia de la plaga. Se recomienda 2 aplicaciones / campaña, considerando un intervalo de 7 días.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo, hasta después de 24 horas de haber aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

PREVAIL-P

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Extracto de cítricos
(contiene *D-limonene*).....5 %
Aditivos.....c.s.p. 100 %

Reg. N° XXX-SENASA-PBA-EV

Titular de Registro:

AGRILAB PERÚ S.R.L.
Jirón Sáenz Peña 355, Dpto. 105
Magdalena del Mar, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 363-8659

Formulado por:

Sineria
SINERIA HOLLAND BV

SINERIA HOLLAND BV
Randwycksingel 20-A015
6229 EE Maastricht, The Netherlands.
+31(0)43 2041120

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua, si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con agua fría.

- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. AGRILAB PERÚ S.A.C.: (1) 363-8659.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas de napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/200L)	(L/Ha)		
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1.25	1.875	N.A.	N.A.
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1.25	5.0	N.A.	N.A.
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.8 - 1.0	2.4 - 4.0	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuo (ppm)

N.A.: No aplica.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREVAIL-P es un insecticida a base de aceite de cítrico, que contiene D-Limonene, actúa por contacto sobre la plaga, interfiriendo la cutícula, con efecto detergente disolviendo los segmentos blandos, dañando la integridad y permeabilidad de la epicutícula, además de bloquear los espiráculos de la plaga-objetivo.

Para la preparación verter las dosis recomendada de **PREVAIL-P** a utilizar, en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien y completar la cantidad de agua. Usar agua limpia y a pH 5.5 a 6.5.

PREVAIL-P, puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación y ante la presencia de la plaga. Se recomienda 2 aplicaciones / campaña, considerando un intervalo de 7 días.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo, hasta después de 24 horas de haber aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

PREVAIL-P

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Extracto de cítricos
(contiene D-limonene).....5 %
Aditivos.....c.s.p. 100 %

Reg. N° XXX SENASA-PBA-EV

Titular de Registro: **AGRILAB PERÚ S.R.L.**
Jirón Sáenz Peña 355, Dpto. 105
Magdalena del Mar, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 363-8659

Formulado por:

Sineria
CYPRUS LTD

SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD.
Aylas Fylaxeos & Zinonos
Rossidi 2 - 2/F, O.C. 3082
Limassol, Cyprus. Chire.
Teléfono: +357 25733310

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con agua fría.

- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. AGRILAB PERÚ S.A.C.: (1) 363-8659.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas de napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/200L)	(L/Ha)		
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1.25	1.875	N.A.	N.A.
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1.25	5.0	N.A.	N.A.
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.8 - 1.0	2.4 - 4.0	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuo (ppm)

N.A.: No aplica.

