

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con agua fría.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y bríndele una posición confortable para respirar.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. AGRILAB PERÚ S.A.C.: (1) 363-8659.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas de napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PREVAIL-P

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Extracto de cítricos

(contiene *D-limonene*).....5 %

Aditivos.....c.s.p. 100 %

Reg. N° 0168-SENASA-PBA-EV

Titular de Registro:

SINERIA PERU SAC

Av. Caminos del Inca 131 Int. 204, Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima – Perú
Teléfono: +51 945138049

Formulado por:



SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD.

Aylas Fylaxeos & Zinonos
Rossidi 2 - 2/F, O.C. 3082
Limassol, Cyprus. Chire.
Teléfono: +357 25733310

Contenido Neto:

1 L

N° de lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREVAIL-P es un insecticida a base de aceite de cítrico, que contiene D-Limonene, actúa por contacto sobre la plaga, interfiriendo la cutícula, con efecto detergente disolviendo los segmentos blandos, dañando la integridad y permeabilidad de la epicutícula, además de bloquear los espiráculos de la plaga-objetivo.

Para la preparación verter las dosis recomendada de **PREVAIL-P** a utilizar, en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien y completar la cantidad de agua. Usar agua limpia y a pH 5.5 a 6.5.

PREVAIL-P, puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/200L)	(L/Ha)		
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1.25	1.875	N.A.	N.A.
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1.25	5.0	N.A.	N.A.
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.8 - 1.0	2.4 - 4.0	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuo (ppm)

N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación y ante la presencia de la plaga.

Se recomienda 2 aplicaciones / campaña, considerando un intervalo de 7 días.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo, hasta después de 24 horas de haber aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

