

ENDEVOR SPEED - 29.4 x 15 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es DANIÑO. No ingerir. - Peligroso si es inhalado. Evitar respirar el vapor o aspersión.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Tetronic acid (Spirodiclofen) + Avermectin (Abamectin).
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por al menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contaminación de la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No hay un antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 AGREVO PERUANA S.A.C.: (01) 632-8482

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y/o artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. - Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento. - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. - No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger las colmenas antes de la aplicación del producto. - Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando. - Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores. - Muy tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros. - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Spirodiclofen.....240 g/L
 Abamectin.....40 g/L
 Aditivos.....c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° 3171 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C.

www.agrevoperuana.com

Jr. San Sebastián 298,
 Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú
 Teléfono: (01) 6328482



Formulador:

HAILIR PESTICIDES AND CHEMICALS GROUP CO., LTD.

East Industry Zone, Chengyang District, Qingdao, Shandong, China

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 200 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ENDEVOR SPEED es un acaricida traslaminar que actúa por contacto e ingestión y está compuesto por dos ingredientes activos con modo de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los ácaros o arañitas presentes en el cultivo. Spirodiclofen pertenece al grupo químico de los ácidos tetrónicos y actúa inhibiendo la síntesis de lípidos y la Abamectina pertenece al grupo químico de las Avermectinas y actúa bloqueando la actividad eléctrica a nivel del sistema nervioso incrementando el poder conductor de las membranas a los iones cloro (similar al efecto producido por el neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico) provocando la parálisis y muerte del insecto o ácaro.

Se recomienda llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/200L		
Palto	Arañita marrón	Oligonychus punicae	0.32	-	14	0.9* 0.01**
Fresa	Arañita roja	Tetranychus urticae	-	0.08	3	2* 0.15**
Mandarina	Ácaro del tostado	Phyllocoptura oleivora	-	0.08	14	0.4* 0.01**
Mandarina	Arañita roja de los citrus	Panonychus citri	-	0.08	14	0.4* 0.01**
Manzana	Arañita roja	Tetranychus urticae	-	0.08	28	0.8* 0.02**
Vid	Arañita roja	Tetranychus urticae	-	0.08	28	0.2* 0.01**
Limón sutil	Arañita roja de los citrus	Panonychus citri	-	0.08	14	0.4* 0.01**
Limón sutil	Ácaro del tostado	Phyllocoptura oleivora	-	0.08	14	0.4* 0.01**
Pimiento	Caracha	Prodioplosis longifila	-	0.30	3	0.2* 0.09**

P.C.: Periodo de Carenia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos *Spirodiclofen **Abamectin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar ENDEVOR SPEED al inicio de la infestación previa evaluación en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga. Se recomienda realizar una aplicación por campaña/año, y luego rotar con otros acaricidas de otros grupos.

En fresa, mandarina, manzana, vid, limón sutil y pimiento:

Se recomienda 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD: ENDEVOR SPEED es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común. Se recomienda antes de efectuar una mezcla, hacer una prueba de compatibilidad con el producto que desea utilizar.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a la señalada en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



ENDEVOR SPEED - 29.4 x 15 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es DANIÑO. No ingerir. - Peligroso si es inhalado. Evitar respirar el vapor o aspersión.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Tetronic acid (Spirodiclofen) + Avermectin (Abamectin).
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por al menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contaminación de la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No hay un antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 AGREVO PERUANA S.A.C.: (01) 632-8482

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y/o artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. - Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento. - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. - No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger las colmenas antes de la aplicación del producto. - Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando. - Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores. - Muy tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros. - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Spirodiclofen.....240 g/L
 Abamectin.....40 g/L
 Aditivos.....c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° 3171 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C.

www.agrevoperuana.com

Jr. San Sebastián 298,
 Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
 La Molina, Lima - Perú
 Teléfono: (01) 6328482

Formulador:

IPROCHEM CO., LTD

35 F, Guomao Business Mansion, No. 3005

Nanhu Road, Luohu District, Shenzhen, China

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 200 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ENDEVOR SPEED es un acaricida traslaminar que actúa por contacto e ingestión y está compuesto por dos ingredientes activos con modo de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los ácaros o arañitas presentes en el cultivo. Spirodiclofen pertenece al grupo químico de los ácidos tetrónicos y actúa inhibiendo la síntesis de lípidos y la Abamectina pertenece al grupo químico de las Avermectinas y actúa bloqueando la actividad eléctrica a nivel del sistema nervioso incrementando el poder conductor de las membranas a los iones cloro (similar al efecto producido por el neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico) provocando la parálisis y muerte del insecto o ácaro.

Se recomienda llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/200L		
Palto	Arañita marrón	Oligonychus punicae	0.32	-	14	0.9* 0.01**
Fresa	Arañita roja	Tetranychus urticae	-	0.08	3	2* 0.15**
Mandarina	Ácaro del tostado	Phyllocoptruta oleivora	-	0.08	14	0.4* 0.01**
Mandarina	Arañita roja de los citrus	Panonychus citri	-	0.08	14	0.4* 0.01**
Manzana	Arañita roja	Tetranychus urticae	-	0.08	28	0.8* 0.02**
Vid	Arañita roja	Tetranychus urticae	-	0.08	28	0.2* 0.01**
Limón sutil	Arañita roja de los citrus	Panonychus citri	-	0.08	14	0.4* 0.01**
Limón sutil	Ácaro del tostado	Phyllocoptruta oleivora	-	0.08	14	0.4* 0.01**
Pimiento	Caracha	Prodioplosis longifila	-	0.30	3	0.2* 0.09**

P.C.: Periodo de Carenia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos *Spirodiclofen **Abamectin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar ENDEVOR SPEED al inicio de la infestación previa evaluación en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga. Se recomienda realizar una aplicación por campaña/año, y luego rotar con otros acaricidas de otros grupos.

En fresa, mandarina, manzana, vid, limón sutil y pimiento:

Se recomienda 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD: ENDEVOR SPEED es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común. Se recomienda antes de efectuar una mezcla, hacer una prueba de compatibilidad con el producto que desea utilizar.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a la señalada en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

