1.3cm

Folio 43

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
-Antes de usar el producto, cerciorarse que es el adecuado y está en perfecto estado.
-Conservar y transportar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. Almacenarlo en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de la casa o habitación.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Transportar el producto en vehículos adecuados para el transporte de plaguicidas químicos y por personas entrenadas para ello.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Utilice equipo de protección personal durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. No permitir el ingreso al área de personas que no lleven los equipos de protección adecuados.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Evitar la aplicación en áreas fuera del tratamiento.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
-Grupo Químico: Spinosinas
-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente ó lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. no deje solo al intoxicado.
-Contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los parpados estén levantados.
-Contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
-En caso de ingestión, si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito.
-En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
-Antídoto: No existe antídoto específico.
NOTA AL MEDICO: Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
Después de usar el contenido, enjuáguje tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

TRIPLE LAVADO OBLIGATORIO ANTES DE ENTREGAR AL CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
-Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
-No aplicar en época de floración del cultivo.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-No aplicar en presencia de polinizadores.
-No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente.
-Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evite la deriva por el viento
-Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
-Peligroso para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
-No permitir animales en el área tratada.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Spanvic®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición
Spinosad 120g/L
Aditivos ..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 1700 - SENASA

Titular de Registro:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Formulado por:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737.China.

Importador y Distribuidor:

avgust crop protection

Contenido: 250 ml
Lote Nro:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
SPANVIC actúa tanto por ingestión como por contacto. Su modo de acción es a nivel del sistema nervioso central de los insectos, con un mecanismo único que evita la resistencia cruzada con otros grupos de otros modos de acción.
Aplicado sobre el follaje se fija e incorpora a los tejidos de la planta de esta manera es protegido de la fotólisis. produce la hiperactivación de las neuronas motores promueve la excitación de los músculos, además otros síntomas como movimiento intenso de las alas, temblores, postración. Finalmente provoca la muerte del insecto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivos	PLAGA		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/200L		
Maíz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	-	0.05-0.075	7	5
Esparrago	Gusano perforador de la bellota	*Heliothis virescens*	0.1	-	1	0.2
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	*Heliothis virescens*	0.20-0.30*	0.10	1	0.3

PC: Periodo de carencia
*Gasto de agua : 400-600L/ha
LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar el producto cuando la plaga está presente. Realizar una aplicación por campaña.
Para pimiento realizar una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO
Reingresar a la zona tratada despúes de 24 horas cuando los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD
Verificar previamente la compatibilidad de la mezcla con otros productos.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registranza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Spanvic®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición:
Spinosad …….. ..... 120 g/L
Aditivos…….. c.s.p. 1L

PQUA N° 1700-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702
Urb. El Rosedal – Lima – Lima - Miraflores
Teléfono: +511 678-9544

Rainbow all about growing

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

avgust crop protection

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas"
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta"

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
Teléfono del titular RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC	LMR
	N. Común	N. científico	L/ha	L/200L	(días)	(ppm)
Maíz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	-	0.05 -0.075	7	5
Esparrago	Gusano perforador de la bellota	*Heliothis virescens*	0.1	-	1	0.2
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	*Heliothis virescens*	0.20-0.30*	0.10	1	0.3

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos *Gasto de agua: 400 – 600 L/Ha

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Contenido neto: Fecha de Formulación:
N° de Lote: Fecha de vencimiento:

500 ml

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
-Antes de usar el producto, cerciorarse que es el adecuado y está en perfecto estado.
-Conservar y transportar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. Almacenarlo en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de la casa o habitación.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Transportar el producto en vehículos adecuados para el transporte de plaguicidas químicos y por personas entrenadas para ello.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Utilice equipo de protección personal durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. No permitir el ingreso al área de personas que no lleven los equipos de protección adecuados.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Evitar la aplicación en áreas fuera del tratamiento.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón

2.0 cm

1.2 cm

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo Químico: Spinosinas
-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente ó lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. no deje solo al intoxicado.
-Contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los parpados estén levantados.
-Contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
-En caso de ingestión, si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito.
-En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
-Antídoto: No existe antídoto especifico.
NOTA AL MÉDICO: Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

-Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
-No aplicar en época de floración del cultivo.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-No aplicar en presencia de polinizadores.
-No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente.
-Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evite la deriva por el viento
-Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
-Peligroso para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
-No permitir animales en el área tratada.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

1.0 cm

Spanvic®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Spinosad ..... 120 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 1700 - SENASA

Titular de Registro:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Formulado por:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737.China.

Importador y Distribuidor:

avgust crop protection

Contenido Neto: 1L
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPANVIC actúa tanto por ingestión como por contacto. Su modo de acción es a nivel del sistema nervioso central de los insectos, con un mecanismo único que evita la resistencia cruzada con insecticidas de otros modos de acción.
Aplicado sobre el follaje se fija e incorpora a los tejidos de la planta de esta manera es protegido de la fotólisis. produce la hiperactivación de las neuronas motores promueve la excitación de los músculos, además otros síntomas como movimiento intenso de las alas, temblores, postración. Finalmente provoca la muerte del insecto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivos	PLAGA		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/200L		
Maíz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	-	0.05-0.075	7	5
Esparrago	Gusano perforador de la bellota	*Heliothis virescens*	0.1	-	1	0.2
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	*Heliothis virescens*	0.20-0.30*	0.10	1	0.3

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos.
*: Gasto de agua : 400-600L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el producto cuando la plaga está presente. Realizar una aplicación por campaña para el espárrago, maiz y pimiento.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar a la zona tratada después de 24 horas cuando los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD

Verificar previamente la compatibilidad de la mezcla con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. .

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

4 L

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo Químico: Spinosinas
-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente ó lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. no deje solo al intoxicado.
-Contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los parpados estén levantados.
-Contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
-En caso de ingestión, si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
-Antídoto: No existe antídoto especifico.
NOTA AL MÉDICO: Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPANVIC actúa tanto por ingestión como por contacto. Su modo de acción es a nivel del sistema nervioso central de los insectos, con un mecanismo único que evita la resistencia cruzada con insecticidas de otros modos de acción.
Aplicado sobre el follaje se fija e incorpora a los tejidos de la planta de esta manera es protegido de la fotólisis. produce la hiperactivación de las neuronas motores promueve la excitación de los músculos, además otros síntomas como movimiento intenso de las alas, temblores, postración. Finalmente provoca la muerte del insecto.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	L/ha	L/200L		
Maíz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	-	0.05 -0.075	7	5
Esparrago	Gusano perforador de la bellota	*Heliothis virescens*	0.1	-	1	0.2
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	*Heliothis virescens*	0.20-0.30*	0.10	1	0.3

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos *Gasto de agua: 400-600 L/ha.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

20L

Spanvic®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición:
Spinosad ..... 120 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

PQUA N° 1700-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú

Formulado por:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737.China.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

avgust crop protection

Contenido Neto: 20L
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. -Antes de usar el producto, cerciorarse que es el adecuado y está en perfecto estado. -Conservar y transportar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. -Almacenarlo en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de la casa o habitación. -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. -Transportar el producto en vehículos adecuados para el transporte de plaguicidas químicos y por personas entrenadas para ello. -Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. -Utilice equipo de protección personal durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. No permitir el ingreso al área de personas que no lleven los equipos de protección adecuados. -Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - Evitar la aplicación en áreas fuera del tratamiento. -Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo Químico: Spinosinas
-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente ó lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. no deje solo al intoxicado.
-Contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los parpados estén levantados.
-Contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
-En caso de ingestión, si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
-Antídoto: No existe antídoto especifico. NOTA AL MÉDICO: Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

-Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. -No aplicar en época de floración del cultivo.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. -No aplicar en presencia de polinizadores.
-No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente.
-Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evite la deriva por el viento
-Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
-Peligroso para organismos acuáticos. -No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. -Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. -Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
-No permitir animales en el área tratada. -El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPANVIC actúa tanto por ingestión como por contacto. Su modo de acción es a nivel del sistema nervioso central de los insectos, con un mecanismo único que evita la resistencia cruzada con insecticidas de otros modos de acción.
Aplicado sobre el follaje se fija e incorpora a los tejidos de la planta de esta manera es protegido de la fotólisis. produce la hiperactivación de las neuronas motores promueve la excitación de los músculos, además otros síntomas como movimiento intenso de las alas, temblores, postración. Finalmente provoca la muerte del insecto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC	LMR
	N. Común	N. científico	L/ha	L/200L	(días)	(ppm)
Maíz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	-	0.05 -0.075	7	5
Esparrago	Gusano perforador de la bellota	*Heliothis virescens*	0.1	-	1	0.2
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	*Heliothis virescens*	0.20-0.30*	0.10	1	0.3

PC: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos
*Gasto de agua: 400-600L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el producto cuando la plaga está presente. Realizar una aplicación por campaña. Para pimiento realizar una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar a la zona tratada después de 24 horas cuando los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD

Verificar previamente la compatibilidad de la mezcla con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
-Antes de usar el producto, cerciorarse que es el adecuado y está en perfecto estado.
-Conservar y transportar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. Almacenarlo en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de la casa o habitación.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Transportar el producto en vehículos adecuados para el transporte de plaguicidas químicos y por personas entrenadas para ello.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Utilice equipo de protección personal durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. No permitir el ingreso al área de personas que no lleven los equipos de protección adecuados.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Evitar la aplicación en áreas fuera del tratamiento.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo Químico: Spinosinas
-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente ó lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. no deje solo al intoxicado.
-Contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los parpados estén levantados.
-Contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
-En caso de ingestión, si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito.
-En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
-Antídoto: No existe antídoto especifico.
NOTA AL MÉDICO: Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

-Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
-No aplicar en época de floración del cultivo.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-No aplicar en presencia de polinizadores.
-No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente.
-Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evite la deriva por el viento
-Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
-Peligroso para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
-No permitir animales en el área tratada.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Spanvic®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Spinosad ..... 120 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 1700 - SENASA

Titular de Registro:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Formulado por:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737.China.

Importador y Distribuidor:

avgust crop protection

Contenido Neto: 200L
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPANVIC actúa tanto por ingestión como por contacto. Su modo de acción es a nivel del sistema nervioso central de los insectos, con un mecanismo único que evita la resistencia cruzada con insecticidas de otros modos de acción.
Aplicado sobre el follaje se fija e incorpora a los tejidos de la planta de esta manera es protegido de la fotólisis. produce la hiperactivación de las neuronas motores promueve la excitación de los músculos, además otros síntomas como movimiento intenso de las alas, temblores, postración. Finalmente provoca la muerte del insecto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivos	PLAGA		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/200L		
Maíz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	-	0.05-0.075	7	5
Esparrago	Gusano perforador de la bellota	*Heliothis virescens*	0.1	-	1	0.2
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	*Heliothis virescens*	0.20 - 0.30*	0.10	1	0.3

PC: Periodo de carencia
*Gasto de agua : 400 - 600 L/ha
LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el producto cuando la plaga está presente.
Realizar una aplicación por campaña para el espárrago, maíz y pimiento.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar a la zona tratada después de 24 horas cuando los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD

Verificar previamente la compatibilidad de la mezcla con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

Pamphlet

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. -Antes de usar el producto, cerciorarse que es el adecuado y está en perfecto estado. -Conservar y transportar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
Almacenarlo en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de la casa o habitación. -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Transportar el producto en vehículos adecuados para el transporte de plaguicidas químicos y por personas entrenadas para ello.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Utilice equipo de protección personal durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. No permitir el ingreso al área de personas que no lleven los equipos de protección adecuados.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - Evitar la aplicación en áreas fuera del tratamiento.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo Químico: Spinosinas
-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente ó lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. no deje solo al intoxicado.
-Contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los parpados estén levantados.
-Contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
-En caso de ingestión, si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
-Antídoto: No existe antídoto especifico. NOTA AL MÉDICO: Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

-Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. -No aplicar en época de floración del cultivo.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. -No aplicar en presencia de polinizadores.
-No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente.
-Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evite la deriva por el viento
-Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
-Peligroso para organismos acuáticos. -No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
-No permitir animales en el área tratada. -El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Spanvic®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición:
Spinosad ..... 120 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

PQUA N° 1700-SENASA

CAS:
mix of 50-95% (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-αL-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione and 50-5% (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione
Formula empírica:
Spinosad: Spinosyn A $C_{41}H_{65}NO_{10}$ Spinosyn D $C_{42}H_{67}NO_{10}$
Formula estructural:



N° CAS: Spinosad: 168316-95-8
Peso molecular: Spinosad: 732 - 746
Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica: Ninguno
Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 0.25, 0.5, 1, 4, 20, 200 L

TITULAR DEL REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702 Urb. El Rosedal – Lima – Lima - Miraflores
Teléfono: +511 678-9544

Rainbow all about growing

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

avgust crop protection

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC	LMR
	N. Común	N. científico	L/ha	L/200L	(días)	(ppm)
Maíz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	-	0.05 -0.075	7	5
Esparrago	Gusano perforador de la bellota	*Heliothis virescens*	0.1	-	1	0.2
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	*Heliothis virescens*	0.20-0.30*	0.10	1	0.3

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos *Gasto de agua: 400-600 L/ha.

Modo de acción: SPANVIC actúa por ingestión y contacto.

Mecanismo de acción: SPANVIC actúa a nivel del sistema nervioso central de los insectos, con un mecanismo único que evita la resistencia cruzada con insecticidas de otros modos de acción. Aplicado sobre el follaje se fija e incorpora a los tejidos de la planta de esta manera es protegido de la fotólisis. produce la hiperactivación de las neuronas motores promueve la excitación de los músculos, además otros síntomas como movimiento intenso de las alas, temblores, postración. Finalmente provoca la muerte del insecto.

COMPATIBILIDAD
Verificar previamente la compatibilidad de la mezcla con otros productos.

PERIODO DE REINGRESO
Reingresar a la zona tratada después de 24 horas cuando los residuos de la pulverización estén secos.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

Número máximo de aplicaciones sucesivas o por cosecha o por campaña o por año:
Se recomienda aplicar el producto cuando la plaga está presente.
Realizar una aplicación por campaña.

Métodos de aplicación: Para garantizar uniformidad de la mezcla, coloque la cantidad **SPANVIC** aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla mecánica, hidráulica o manualmente. Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA