

28.00 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PYROTOP® 100 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Pyriproxyfen 100 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 0000 - SENASA

Titular de registro:

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PALTA HASS DEL PERU
Av. Nicolas Arriola Nro. 314 Int. 901 (902) Lima - Lima - La Victoria
Teléfono: (01) 225-1626 | (01) 226-0010

Formulador:

Shanghai Maiheng Chemicals Technology Co. Ltd.
Rm 410, 1398 Jinqiao Rd., Pudong District, Shanghai, China.
Teléfono: 021-50897366 / Fax: 021-50395038

Importador y Distribuidor:

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 1L
Fecha de vencimiento:



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PYROTOP® 100 EC es un insecticida de contacto que regula el crecimiento de los insectos. **PYROTOP® 100 EC** es un agonista hormonal juvenil: suprime la embriogénesis y la metamorfosis en varias especies de insectos como *Fiorinia* y *Aleurodicus juletkae*.

Preparación de la mezcla:

Verter el producto en un recipiente pequeño, pre-mezclar todo el producto a usar con un poco de agua hasta que se forme una solución uniforme, la misma que se debe verter en el tanque de de aplicación que tiene 50% de su capacidad con agua, agitar y luego llenar con agua hasta completar su capacidad.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	L/200L		
Palto	"Queresa"	<i>Fiorinia fiorinae</i>	-	0.150	28	1
Palto	"Mosca blanca"	<i>Aleurodicus juletkae</i>	-	0.15-0.175	28	1

PC: Período de carencia / LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar, vía aspersión foliar terrestre, hasta 2 aplicaciones por campaña, 1 campaña al año, y una frecuencia entre aplicaciones de 15 - 30 días, el momento de aplicación es a la aparición de los primeros individuos o cuando el daño esté por alcanzar el umbral económico.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar, sin protector, al campo antes de 24 horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

PYROTOP® 100 EC es incompatible con materiales ácidos y alcalinos fuertes. Se recomienda realizar un test de compatibilidad antes de aplicar.

FITOTOXICIDAD:

PYROTOP® 100 EC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y formas recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:
LIGERAMENTE PELIGROSO**



PELIGRO



14.60 cm