

# Malezuron<sup>®</sup>

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

**HERBICIDA AGRICOLA**

**GRANULOS DISPERSABLES - WDG**

## Composición:

Metsulfuron-methyl ..... 600 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° - SENASA

## Titular de Registro:

**NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.**

Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,  
Miraflores, Lima, Peru  
Teléfono: (01) 222-2795



## Formulado por:

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**

Room 10-6, Shidai Square, N°8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: +86-574-87301088

## Importado y Distribuido por:



Av. República de Panamá 2577  
La Victoria, Lima-Perú  
Teléfono: (1) 710-4068

## N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

**Contenido Neto: 250 Kg**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

## “LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Peligroso si es inhalado.
- Evite respirar la exposición.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante a los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacene este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **GRUPO QUÍMICO:** Sulfonilureas
- En caso de intoxicación llame al médico o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco.
- Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106  
NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.: (01) 222-2795

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido inútilcelo triturándolo y/o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**MALEZURON<sup>®</sup>** es un herbicida sistémico selectivo que es absorbido a través de las raíces y el follaje y translocado al ápice de las plantas.

**MALEZURON<sup>®</sup>** se emplea haciendo una pre-mezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Actúa inhibiendo la acetolactato sintetasa, por lo que se bloquea la biosíntesis de aminoácidos de cadena ramificada, valina, leucina e isoleucina. Esta inhibición provoca la rápida detención de la división celular y el crecimiento.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis (Kg/Ha.)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
ARROZ	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	0.008	60	0.05
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>			

P.C. Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar como máximo dos aplicaciones por campaña/año.

### PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD

**MALEZURON<sup>®</sup>** es incompatible con productos de reacción alcalina.

### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

