Longitud Total 28.9 cm.

Altura Total 13.5 cm.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Evite el contacto.Posible carcinógeno.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiese, bañese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminade.
- Utilice ropa protectora durante el mezcado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ei producto es irrtatantes para los ojos la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar est producto en un ambiente cerrado, seco y ventilado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- **Grupo Químico: Benzimidazoles.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente,o lleve al paciente al centro médico mas cercano,mostandole la etiqueta.
- En caso de inhalación ,colocar a la victima una zona de aire fresco.Aplicar respiración artificial,si la respiración es deficiente o a cesado.
- En caso de contacto los ojos, lavarloscon abundente agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente queseen cuentre inconsciente.
- Nota al médico: no tiene antídoto especifico ,seguir trantamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
TALEX PERU S.A.C.: 612-6565

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fréasticas superficiales o suelos alta mente permeable.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

KANAK®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Carbendazim	500 g/L
Aditivos	c.s.p.1L

Reg. PQUA N° 3231 - SENASA

Titular de Registro:
TALEX PERU S.A.C.
Calle René Descartes No 311Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Teléfono: 612-6565

Formulador:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: +86-574-87301088

Importador y Distribuidor:
TALEX PERU S.A.C.
Calle René Descartes No 311Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Teléfono: 612-6565

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 L

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
KANAK® es un fungicida sistémico, con acción protectora y curativa, su acción inhibe el desarrollo de los tubos germinativos, la formación de apresorios y el crecimiento micelial del hongo.

KANAK® se emplea en aspersión haciendo una pre-mezcla, segun la dosis indicada en la etiqueta, en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Usar agua limpia con pH neutro, no usar aguas duras o barrosas. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha		
Cebolla	Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.4	0.7-1	7	0.1
Fresa	Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.3-0.4	-	2	0.1
Tomate	Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.30-0.35	-	7	0.5

LMR: Límite máximo de residuos **PC:** Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o la presencia de los síntomas iniciales de la enfermedad. Se recomienda usar con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción. Realizar 1 sola aplicación por campaña al año, para todos los cultivos recomendados.

PERÍODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
KANAK® Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina. hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la meczla completa. Si se tiene duda consulte con un ingeniero agrónomo o a la empresa proveedora.

FITOTOXICIDAD
No es fitotoxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Longitud Literal 27 cm.

09 cm

Longitud de Color 28 cm.