

"¡MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!"

ARALID 38% WDG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:

Pyraclostrobin..... 128 g/kg
Boscalid.....252 g/kg
Aditivos..... c.s.p.1 kg

Reg. PQUA N° 3124 - SENASA

Titular del Registro:

NUTRITEC COMPANY S.A.C.
Caf. Felipe S. Crespo N° 421,
Distrito de San Luis, Lima - Perú
Teléfono: 983 481 769
E-mail: alidem@hotmail.com

Formulador:

青島利得植保技术有限公司
Qingdao Agro-unitek Crop Science Co., Ltd.
Room 304, Haier Road No. 63,
Qingdao City, Shangdong, China
Tel: +86 5328095916 Fax: +86 5328095916

Importador / Distribuidor:

NUTRITEC COMPANY S.A.C.
Caf. Felipe S. Crespo N° 421,
Distrito de San Luis, Lima - Perú
Teléfono: 983 481 769
E-mail: alidem@hotmail.com

LOTE N°
FECHA DE FAB.
FECHA DE VCTO.

CONTENIDO NETO: 100g

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"¡MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto se debe cuidar, no ingerir.
- Peligroso si se inhala. Evite respirar polvo o aerosolización.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y pásele a ingresar al área de trabajo en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Streptococci y Baciloides + Pyridinecarboxamide (Borica de Pyraclostrobin).
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, levante con abundante agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y cámbiese.
- contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasládela a un ambiente ventilado. Brinde respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU 106
Teléfono del titular: Nutritec Company S.A.C. +51 983 481 769

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague la funda o bolsa conteniendo. Entregue o deposita en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligro para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrestos del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 05 metros.
- Peligro para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar en zonas con rapa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su contaminación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARALID 38% WDG, fungicida sistémico y translaminar con propiedades protectoras y curativas. Cuello se aplica por vía foliar, puede destruir selectivamente el micelio del hongo durante el período de incubación impidiendo que se originen lesiones o daños en el cultivo.

ARALID 38% WDG se prepara diluyendo la dosis indicada en el cultivo previo con agua, luego esta solución se lleva al cultivo o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Se usa en pulverizaciones al follaje con mochila.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Nombre Común	Enfermedad	Dosis Kg/ha	Dosis (días)	PC	LMR (ppm)
Vid	Oldios	Erysiphe necator	0.12 - 0.18	0.50-0.65	14	2.00 ¹ 5.00 ²

PC: Período de Carenza LMR: Límite Máximo de Residuos¹ Pyraclostrobin² Boscalid

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar ARALID 38% WDG con una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año.
- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad (Alta humedad relativa).
- Rotar con otros fungicidas de diferente modo de acción con el fin de evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: SEQUIJAS WDG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza muy ácida.

FITOTOXICIDAD: El producto no causa fitotoxicidad si es usado en el cultivo recomendado y dosis señaladas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, al ser usada y manejada de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

