

SIZE: 14.5 x 21.0 cm

11/10/2023

**“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No se exponga al contacto, ni respire la neblina a vapores provenientes de la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No exponer a radiación solar.
- Después de la aplicación lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo y ropa que puedan haber tenido contacto con el producto.
- Lavar el equipo de aplicación con abundante agua, cuidando de no vaciar su contenido en fuentes de agua.
- No transportar ni almacenar junto con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente. Acudir al médico.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar al médico.
- No existe antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar:

SAMU: 106 ó NOVAGRO-AG S.A.C.: +51 (044) 273330

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos o restos de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PAL CHINCHE-AG® es un insecticida biológico a base de una mezcla única de extractos vegetales (ajo y azadiracthin), su modo de acción es por ingestión y contacto. Provoca la inhibición de la respiración y la sobreexcitación del sistema nervioso. Así mismo, se inhibe el proceso de muda al bloquear la síntesis de ecdisona (hormona de crecimiento), interrumpe la alimentación, deteniendo el crecimiento y reproducción en los insectos llevándolos a la muerte.

Para la preparación de la mezcla y aplicación se diluye la dosis indicada en un recipiente previo con agua. Agitar bien, completar con agua hasta llegar al volumen requerido. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Palto	Ácaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	0.3 - 0.35	0.88 - 1.20	NA	NA
Arándano	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.30 - 0.40	0.85 - 1.15	NA	NA

PC: Periodo de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

NA: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de palto y arándano se recomienda realizar 03 aplicaciones por campaña como máximo, con intervalos de aplicación de 25 a 30 días, considerando 01 campaña por año. Las aplicaciones deben ser de manera preventiva, cuando haya inicios de ataque de la plaga o cuando se observen los primeros daños, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada después de transcurridas las 4 horas, con equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con los agroquímicos de uso común. No debe mezclarse con productos alcalinos. Se aconseja hacer pruebas de compatibilidad previas a la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No se observan efectos de fitotoxicidad en los cultivos recomendados, si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.”

