

280.00 mm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambiente fresco, secos y ventilados.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos, bebidas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en la primeras 42 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación retire a la persona a una zona abierta y llame al médico o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No proporcionar nada a una persona inconsciente. Trasladar inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un área ventilada. Brindar respiración artificial de ser necesario.
- Antídoto, no hay antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106 / AGRO ADVICE PERÚ SAC: 933-884942

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques y arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Evitar la deriva por el viento.
- No arrojar los sobrantes del producto, ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de riego, etc.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para evitar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MICOTOX

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA
AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición Química:

Fungos proteoglycan.....10 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. N° xxxx – SENASA - PBA - EV

Titular del Registro:

AGRO ADVICE PERU SAC



Formulador:

Thinkagro Co., Ltd

No.496 North Qianshan Rd., Hefei, China

Importador y distribuidor:

AGRO ADVICE PERU SAC

Jr. Noruega 2472. Urb La Trinidad-Lima

RUC: 20602016791

Teléfono: 933-884942

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MICOTOX es un fungicida biológico a base de un polisacárido presente en forma natural en hongos actúa por contacto y de forma sistémica, tiene una acción inhibidora al encapsular el inoculo y las hifas de penetración de los patógenos inhibiendo el crecimiento micelial y la germinación de esporas
Además, induce mecanismos de resistencia naturales de las plantas contra hongos patógenos.

MICOTOX se aplica en forma de aspersión foliar para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado agitando constantemente. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/cil	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	400-500	N.A.	**
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	200-400	N.A.	**

PC: Periodo de carencia

N.A.: No aplica

**Exento de tolerancia.

L.M.R.: Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda hasta 3 aplicaciones como máximo, por campaña, El intervalo de días depende de las evaluaciones de campo. Pero se recomienda de 7 a 10 días entre aplicación.

COMPATIBILIDAD:

MICOTOX es compatible con la mayoría de plaguicidas, a excepción con los de reacción alcalina. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

150.00 mm



PRECAUCIÓN

