

27.5 ± 0.3 cm

0.5 ± 0.2

0.5 ± 0.2

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor a los 5 km/h.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Ácidos tetrámicos**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración ni cuando exista presencia de abejas y otros polinizadores en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de la aplicación del producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

Composición:

Spirotetramat: 150 g/L
Aditivos: c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 3242-SENASA



Titular de Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores
Lima 18 - Perú
Tel.: (01) 617 - 3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido neto: 1L

N° de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
8 South Liyun Road, Jiangning Dis.
Nanjing 211100 CHINA

Líquido Combustible

"Nocivo en caso de ingestión"
"Nocivo en contacto con la piel"
"Nocivo si se inhala"



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

IMPLACABLE® PLUS 150 OD es un insecticida que contiene spirotetramat, el cual es sintético y efecto traslaminar, actúa por ingestión inhibiendo el acetil CoA carboxilasa y afectando así la biosíntesis de lípidos de tal manera que la muda de los inmaduros no puede completarse y por ello mueren. Según la IRAC este insecticida pertenece al Grupo 23.

IMPLACABLE® PLUS 150 OD se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en la mitad de volumen de agua a utilizar; agitar la mezcla y completar el volumen de aplicación. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.), que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
ARANDANO	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	0.15-0.30	-	7	1.5
GRANADO	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.15 - 0.20	-	22	0.4
PIMIENTO	Caracha	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.15-0.20	-	1	1
VID	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.1 - 0.15	1.0 - 1.5	7	2

P.C.: Período de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación y ante la presencia de la plaga, con un máximo de 1 aplicación por campaña en los cultivos de granado y vid, considerando 1 campaña anual, y 2 aplicaciones por año en el cultivo de pimiento, considerando 2 campañas anuales.
- En caso de persistencia de la plaga, rotar con otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia.
- Aplicar como máximo 1.5 L/ha. Para el cultivo de Pimiento aplicar como máximo 800 L/ha.
- No aplicar a temperaturas mayores a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- NO APLICAR EN ÉPOCA DE FLORACIÓN. En pimiento, aplicar crecimiento vegetativo y, si el nivel de infestación de la plaga lo justifica, en la etapa inicial de fructificación

PERÍODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: IMPLACABLE® PLUS 150 OD es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica N°4
LIGERAMENTE PELIGROSO



14.0 ± 0.3 cm

2.1 cm