

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# GOLDROLE XTRA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

**COMPOSICIÓN:**

Flubendiamide.....200 g/kg  
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° 3241-SENASA

**TITULAR DE REGISTRO:**

**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702  
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.  
Teléfono: (01) 678-9544



**FORMULADOR:**

**QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD**

No 8 Haipubei road, Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science  
and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China  
Teléfono: 0086-532 - 68081298  
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com  
www.rainbowagro.com

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**

**SOLANDINA PERU S.A.C.**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702  
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.  
Teléfono: +51 992 763 127

**Contenido Neto: 250 G**

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala  
Muy Tóxico para organismos acuáticos



**ATENCIÓN**

210mm

150mm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
- Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS****Grupo químico: Benzene-dicarboxamide**

- En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106  
 RAINBOW AGROSCIENCES: (01) 678-9544

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- No aplicar si se verifica la presencia polinizadores, abejas y/o artrópodos beneficios en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos antes de aplicar el producto, para el confinamiento y protección de los colmenares.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**GOLDROLE XTRA** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del músculo esquelético de los insectos.

Agitar el contenido de **GOLDROLE XTRA** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **GOLDROLE XTRA** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| CULTIVO   | PLAGA                                  |                            | DOSIS      |             | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|           | N. Común                               | N. científico              | Kg/200L    | Kg/ha       |              |              |
| Esparrago | Gusano perforador grande de la bellota | <i>Heliothis virescens</i> | -          | 0.20 – 0.25 | 14           | 0.01         |
| Palto     | Gusano medidor                         | <i>Sabulodes aegrotata</i> | 0.05-0.075 | 0.3 – 0.45  | 1            | 0.01         |

PC: Periodo de carencia      LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Puede ser aplicado 1 vez por campaña. El producto debe ser aplicado previa evaluación del campo, cuando se tenga presencia de la plaga, la indicación aplica para los cultivos de palto y esparrago.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**Categoría Toxicológica 4**  
**"LIGERAMENTE PELIGROSO"**

