12 cm

18 cm

# XENTHO 25 WG

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES - WG**

**Composición:**

Thiamethoxam ..... 250 g/kg

Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA N° 3246 - SENASA**

**Importado y distribuido por:**

NEXXT
INNOVACION & RENDIMIENTO

Dirección: Av. Mariscal Eloy Ureta N° 156.
Urb. El Pino (Piso 1 y 3). San Luis, Lima-Perú
Tel.: 3261910

**Formulado por:**

NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.
Piso 5, N° 18 Suove Road Nanjing 210017, P.R.China
Teléfono: 86 25 86455862 / 86455863

F. de form:
N° Lote
Contenido Neto: **100 g**
F. de venc:

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

12 cm

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIóN**

- Este producto es dañino por inhalación. Evite respirar el polvo o la aspersión.
- Use protector. Causa daño temporal a los ojos.
- No ingerir, ni aspirar la aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, manipulación, aplicación y para ingresar al ambiente de tratamiento en las primeras 24 horas
- No comer, beber ni fumar durante la mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado, lejos de su casa.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Neonicotinoide.
- Si se produce el envenenamiento, inmediatamente contacte a un médico, a un centro de información toxicológica. Mostrar la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106**
**NEXXT S.A.C.: 3261910**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIóN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**XENTHO 25 WG** es un insecticida sistémico neo--nicotinoide que actúa por contacto e ingestión. Se considera que actúa por interferencia del receptor acetil colina-nicotínico del sistema nervioso, cau--sando parálisis y muerte de los insectos afectados.

Aplicar **XENTHO 25 WG** en mezcla con un volumen suficiente de agua uniformemente sobre el follaje de las plantas. Para preparar la mezcla llene el tanque hasta la mitad con agua limpia y poner los agitadores en marcha, luego agregar la cantidad recomendada de **XENTHO 25 WG** y finalmente completar el llenado del tanque con agua.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIóN:**

- Realizar como máximo 1 aplicación/campaña cuando se observe los primeros síntomas de daños en los brotes tiernos de las plantas de esparrago. Como máximo aplicar 0,39 kg/ Ha
- De persistir la plaga, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.
- No aplicar en época de floración.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las primeras 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** No se conoce incompatibilidad con otros plaguicidas.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico al cultivo y a la dosis recomendada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRóNOMO”**

| Cultivo | Plaga | | Dosis | PC | LMR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | Kg/Cil | (días) | (ppm) |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes | *Prodiplosis longifila* | 0,07 | 7 | 0,05 |
| Mandarina | Queresa coma | *Lepidosaphes beckii* | 0,05 - 0,06 | 28 | 0,2 |
| Palto | Queresa | *Fiorinia fioriniae* | 0,065 - 0,07 | 21 | 0,05 |

**PC:** Periodo de Carencia (días) / **LMR:** Límites Máximos de Residuos (ppm)

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA