

150 mm (5.9")

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Shocker-T® 90PS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
POLVO SOLUBLE (SP)
(CONTIENE BOLSA HIDROSOLUBLE)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Methomyl..... 900 g/kg
Aditivos..... csp 1kg

PQUA N° 3254-SENASA
"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"
Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



AgroKlinge
A member of ADAMA
Agro Klinge S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú.
Telf: (01) 641-0000

Formulador:
Shandong Huayang Pesticides Co., Ltd
Ciyao, Ningyang Shandong, 271411
China

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 100 g

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO  **NO EXPLOSIVO**

ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

8 134 mm 8

15 mm
190 mm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
 *Este producto es DAÑINO, puede ser letal si es INHALADO.
 *Cuidado, evite el contacto, NO RESPIRE POLVO, VAPOR o ASPERSIÓN.
 *Causa DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.
 *El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
 *No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 *Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 *No almacenar en casas de habitación.
 *Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
 *No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 *Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
 *Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 *Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
 *Grupo Químico: Carbamato.
 *VER Hoja Informativa adjunta.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; AGRO KLINGE S.A. (01) 641-0000.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
 *VER Hoja Informativa adjunta.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: SHOCKER-T 90PS es un insecticida sistémico, que actúa inmediatamente por contacto e ingestión. Su acción residual varía de 4 a 7 días después de aplicado, descomponiéndose sin causar problemas de residuos en los productos cosechados. SHOCKER-T 90PS se aplica en mezcla con agua. Para su preparación, corte el sobre laminado y voltéelo para que la bolsa hidrosoluble caiga en el agua y se disuelva en el tanque junto con el producto, luego agite para lograr una mezcla homogénea.
 En ningún caso debe abrirse la bolsa hidrosoluble"

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 200-400 L/ha cultivos bajos, 600-800L/ha cultivos altos.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando se observe la presencia de la plaga. En caso de reinfestación aplicar otro ingrediente activo de diferente modo de acción.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis indicadas en los cultivos recomendados.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con los productos de reacción alcalina.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	g/200L		
ALFALFA	"Caballada"	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	0.3-0.45	200-250	7	0.02
FRIJOL	"Gusano medidor"	<i>Pseudoplusia includens</i>	0.45	250	3	0.05
MAÍZ	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3-0.45	200-250	7	0.02
ZAPALLO	"Perforador de guías y frutos"	<i>Diaphania nitidalis</i>	0.45	250	3	0.2
TOMATE	"Gusano de los frutos"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.3-0.45	200-250	1	0.01
ESPÁRRAGO	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	(*) Ver tratamiento de turiones		1	0.01
PALTO	"Queresa del palto"	<i>Fiorinia floriniae</i>	---	200	1	2

P.C. = Periodo de carencia
L.M.R. = Límite máximo de residuos
 (*) TRATAMIENTO DE TURIONES: Sumergir los "turiones" en una solución que contenga 80-100 g de SHOCKER-T 90PS por cada 100 litros de agua.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

© Marca Registrada



- PANTONE 199 C
- PANTONE 347 C
- Process Black C
- PANTONE Reflex Blue C
- PANTONE 7483 C