

150 mm (5.9")

15 mm

205 mm (8")

190 mm

8

134 mm

8

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

(CONTIENE BOLSA HIDROSOLUBLE)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Methomyl..... 900 g/kg

Aditivos..... csp 1kg

PQUA N° 3254-SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



Agro Klinge S.A.

Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú.

Telf: (01) 641-0000

Formulador:

Shanghai E-Tong Chemical Co Ltd.

No.23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Song Jiang District,

Shanghai, China Telf.: +86-21-51698968

Lote N°:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 100 g

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO

TÓXICO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DAÑINO, puede ser letal si es INHALADO.
- Cuidado, evite el contacto, NO RESPIRE POLVO, VAPOR o ASPERSIÓN.
- Causa DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Carbamato
- VER Hoja Informativa adjunta.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; AGRO KLINGE S.A. (01) 641-0000.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: VER Hoja Informativa adjunta.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: SHOCKER-T 90PS es un insecticida sistémico, que actúa inmediatamente por contacto e ingestión. Su acción residual varía de 4 a 7 días después de aplicado, descomponiéndose sin causar problemas de residuos en los productos cosechados. SHOCKER-T 90PS se aplica en mezcla con agua. Para su preparación, corte el sobre laminado y viértelo para que la bolsa hidrosoluble caiga en el agua y se disuelva en el tanque junto con el producto, luego agite para lograr una mezcla homogénea.

En ningún caso debe abrirse la bolsa hidrosoluble"

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 200-400 L/ha cultivos bajos, 600-800L/ha cultivos altos.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando se observe la presencia de la plaga. En caso de reinfestación aplicar otro ingrediente activo de diferente modo de acción.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis indicadas en los cultivos recomendados.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con los productos de reacción alcalina.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	g/200L		
ALFALFA	"Caballada"	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	0.3-0.45	200-250	7	0.02
FRIJOL	"Gusano medidor"	<i>Pseudoplusia includens</i>	0.45	250	3	0.05
MAÍZ	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3-0.45	200-250	7	0.02
ZAPALLO	"Perforador de guías y frutos"	<i>Diaphania nitidalis</i>	0.45	250	3	0.2
TOMATE	"Gusano de los frutos"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.3-0.45	200-250	1	0.01
ESPÁRRAGO	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	(*) Ver tratamiento de turiones		1	0.01
PALTO	"Queresa del palto"	<i>Fiorinia floriniae</i>	---	200	1	2

P.C. = Período de carencia

L.M.R. = Límite máximo de residuos

(*)TRATAMIENTO DE TURIONES: Sumergir los "turiones" en una solución que contenga 80-100 g de SHOCKER-T 90PS por cada 100 litros de agua.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

© Marca Registrada



PANTONE 199 C

PANTONE 347 C

Process Black C

PANTONE Reflex Blue C

PANTONE 7483 C