

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

TRICHOSYM es un fungicida biológico que debe ser usado de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la etiqueta:

- Use guantes, overol, protector de ojos y rostro. No aspire la neblina del producto.
- No coma, beba o fume durante su mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No reenvasar ni depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Evitar exponer el producto directamente al sol.
- Su almacenamiento debe hacerse en lugares techados, frescos y bien ventilados.
- Manténgase alejado del calor, en su envase original bien cerrado y etiquetado.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca y buscar atención médica. No provocar el vómito.
- En contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos.
- **Teléfonos de emergencia:**
SAMU: 106
AGRILAB PERU SRL: 3638659

NOTA AL MÉDICO

No tiene antídoto específico. Tratar sintomáticamente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre
- Peligroso para los peces
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Nocivo para la fauna benéfica
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.

TRICHOSYM

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión concentrada (SC)

Composición:

Trichoderma harzianum cepa T 78..... 3.4 g/L
Aditivos c.s.p 1.0 L

Reg.N°xxx - SENASA-PBA- ACBM

Titular de Registro: AGRILAB PERU SRL

Jiron Saenz Peña 344 - Dpto 105 Magdalena del mar
Teléfono: +51 363 - 8659

Formulado por: SYMBORG S.L.

Avda. Jesús Martínez Cortado, 51. P.I. Cabezo Cortado..
30100 - Murcia - España
Teléfono: +34 968 899 250

Importado por: AGRILAB PERU SRL

Jiron Saenz Peña 344 - Dpto 105 Magdalena del mar
Teléfonos:+51 363 - 8659

Contenido Neto: **1 L**

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRICHOSYM es un fungicida biológico, a base del organismo vivo de esporas del hongo *Trichoderma harzianum* T78. Estas cepas colonizan rápidamente las raíces de las plantas, actuando por antibiosis, parasitismo, competencia que inhiben la germinación de las esporas y el crecimiento de los microorganismos fitopatógenos.

- Método de aplicación: aplicar vía terrestre en drench al cuello de la planta. También se puede aplicar por fertirrigación o riego por goteo. Tome la dosis indicada de TRICHOSYM y disuelva en suficiente agua para facilitar su incorporación.
- El producto debe ser conservado en su envase original. Aplique la solución que contenga el producto el mismo día de su preparación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| Cultivo | Plaga | | Dosis | PC | LMR |
|---------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-------|
| | Nombre común | Nombre científico | Por Ha (L) | (días) | (ppm) |
| Lechuga | Podredumbre blanca | <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> . | 2.0 | N.A. | N.A. |

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Período de Carencia. N.A.: No aplicable

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Puede ser aplicado en todas las etapas fenológicas del cultivo, de preferencia en etapas iniciales. Es necesario calibrar el equipo para aplicar la dosis correcta por hectárea. Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña/Ha. Aplicar TRICHOSYM al inicio del desarrollo vegetativo, con una frecuencia de 20 días, aplicar durante las primeras horas de la mañana o al atardecer.

PERIODO DE REINGRESO: El tiempo de reingreso al campo tratado es de 12 horas.

COMPATIBILIDAD: no se recomienda aplicar este producto junto con otros productos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se usa en las dosis que se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

