

270 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

TRICHOSYM es un fungicida biológico que debe ser usado de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la etiqueta:

- Use guantes, overol, protector de ojos y rostro. No aspire la neblina del producto.
- No coma, beba o fume durante su mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No reenvasar ni depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Evitar exponer el producto directamente al sol.
- Su almacenamiento debe hacerse en lugares techados, frescos y bien ventilados.
- Manténgase alejado del calor, en su envase original bien cerrado y etiquetado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca y buscar atención médica. No provocar el vómito.
- En contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106, CISPROQUIM: 080-050-847
Corteva Agriscience Perú SAC: 4214811

NOTA AL MÉDICO

No tiene antidoto específico. Tratar sintomáticamente.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.

THYDRA

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Trichoderma harzianum cepa T 78..... 3.4 g/L
Aditivos c.s.p. 1.0 L

Registro N° 180-SENASA-PBA-ACBM

Titular del Registro: **Corteva Agriscience Perú S.A.C.**
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III,
Urbanización Club Golf Los Incas, Santiago de Surco, Lima, Perú.

FORMULADO POR:

Symborg S.L.
Avda. Jesús Martínez Cortado, 51.
P.I. Cabezo Cortado, 30100 - Murcia - España.
Teléfono: +34 968 899 250

IMPORTADO POR:

CORTEVA agriscience
Corteva Agriscience Perú S.A.C.
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208,
Interior 705-B, Torre III, Urbanización Club Golf
Los Incas, Santiago de Surco, Lima, Perú.

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

N° DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

™ © Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva.

000000 2504

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

THYDRA es un fungicida biológico, a base del organismo vivo de esporas del hongo *Trichoderma harzianum* T78. Estas cepas colonizan rápidamente las raíces de las plantas, actuando por antibiosis, parasitismo, competencia que inhiben la germinación de las esporas y el crecimiento de los microorganismos fitopatógenos.

- Modo de empleo: aplicar vía terrestre en dranch al cuello de la planta. También se puede aplicar por fertirrigación o riego por goteo. Tome la dosis indicada de **THYDRA** y disuelva en suficiente agua para facilitar su incorporación.
- El producto debe ser conservado en su envase original. Aplique la solución que contenga el producto el mismo día de su preparación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Lechuga	Podredumbre blanca	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	2,0	N.A.	N.A.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

NA: No Aplicable.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado en todas las etapas fenológicas del cultivo, de preferencia en etapas iniciales. Es necesario calibrar el equipo para aplicar la dosis correcta por hectárea. Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña/Ha. Aplicar **THYDRA** al inicio del desarrollo vegetativo, con una frecuencia de 20 días, aplicar durante las primeras horas de la mañana o al atardecer.

PERIODO DE REINGRESO: El tiempo de reingreso al campo tratado es de 12 horas.

COMPATIBILIDAD: no se recomienda aplicar este producto junto con otros productos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se usa en las dosis que se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



120 mm