

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No fumar, comer ni beber durante la manipulación y uso de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Evite la inhalación o el contacto con los ojos, la piel o heridas abiertas. No inhale la niebla de aspersión.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y si el contacto fuese directo con la piel, lave con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión inducir el vómito y acudir al médico. No inducir al vómito a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS :

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE :

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos 5 metros.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada

TOWER®

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Acido cítrico.....	3.00 %
Acido láctico.....	4.13 %
Acido ascórbico.....	2.50 %
Aditivos.....	csp 1L

Reg. N° 003-SENASA - PBA-EV

Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.
 Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú.
 Telf: (01) 641-0000.

Formulado por:
Tecnología Química y Comercio S.A.
 Calle René Descartes No 311,
 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
 Telf.: 612-6565 Fax: 348-1020
 R.U.C N° 20307150981

Titular del Registro:
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
 Av. EL Derby 254. Int 306.
 Santiago de Surco.
 Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

Lote N°:
 Fecha de Producción:
 Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 20 L

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- TOWER** es un fungicida sistémico. Afecta la membrana celular de los microorganismos patógenos.
- El producto se emplea en el campo, mediante método de aspersión foliar, empleando equipos de aplicación terrestre como pulverizador manual o bomba de mochila.
- Modo de empleo: llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **TOWER**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.
- Se recomienda calibrar el equipo para obtener el gasto de agua adecuado, que permita cubrir el follaje y frutos totalmente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/200 L	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
VID	"Oidium"	<i>Erysiphe necator</i>	1	N.A	N.A.
	"Podredumbre gris/" "Moho gris"	<i>Aspergillus niger</i> <i>Penicillium digitatum</i>	0.5 - 0.8	N.A	N.A
	"Podredumbre gris/" "Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	N.A	N.A
"PALTO	"Antracnosis"	<i>Colletotrichum gleosporioides</i>	0.5	N.A	N.A
"MANGO	"Antracnosis"	<i>Colletotrichum gleosporioides</i>	0.5	N.A	N.A
ARANDANO	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5 - 0.6	N.A.	N.A.
"MANDARINO	"Moho verde"	<i>Penicillium digitatum</i>	0.5	N.A.	N.A.

P.C: Período de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos NA: No aplica
 (*) Para aplicación en post-cosecha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En el cultivo de vid, aplicar a inicios de infestación, durante las primeras horas del día o al atardecer. Realizar máximo una (01) aplicación por campaña, 01 campaña al año.

En post-cosecha realizar una aplicación inmediatamente después de la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO:

Después de 12 horas.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con los plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto

PRODUCTO PERUANO



PRECAUCIÓN



Alto: 20 cm
 Ancho: 33 cm