Longitud Total 28.9 cm.

Altura Total 13.5 cm.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido agroquímicos debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y si el contacto fuese directo con la piel, lave con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencia: SAMU 106
BIOGEN AGRO S.A.C. 01 6126565

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Ningún envase que haya contenido agroquímicos debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos 5 metros.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CYTOFIX®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Citoquininas ..... 24 g/L
Aditivos ..... csp 1L

Reg. RCP 105-SENASA

Titular del Registro, Formulador:
BIOGEN AGRO S.A.C.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565

Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da. Etapa, Ate. Lima - Perú
Telf.: 612-6565
R.U.C. Nº 20307150981

Fecha de Formulación:
Lote Nº:
Contenido Neto: **1 L**
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
CYTOFIX® es un Regulador de Crecimiento de Plantas, a base de citoquinina cuyo ingrediente activo es 6-Benzyladenine, la cual regula muchos aspectos importantes del desarrollo de las plantas en los órganos aéreos y subterráneos. También media las respuestas a factores extrínsecos variables, como las condiciones de luz en el brote y la disponibilidad de nutrientes y agua en la raíz, y tiene un papel en la respuesta al estrés biótico y abiótico. Fomenta la división celular en el fruto en desarrollo, lo que conduce a un mayor número de células en los frutos y la posibilidad de obtener frutos más grandes.
En conjunto, estas actividades contribuyen al ajuste de la regulación cuantitativa del crecimiento en las plantas.

CYTOFIX® Se aplica en mezcla con agua. Para la preparación, calibrar el volumen de agua a utilizar; en la mitad de agua disolver la dosis de **CYTOFIX®** a aplicar, agitar vigorosamente para homogenizar la mezcla y completar al volumen calculado para cubrir el área a tratar. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.
Se recomienda calibrar el equipo para obtener el gasto de agua adecuado, que permita cubrir el follaje y frutos totalmente.
La mezcla debe ser aplicada el mismo día de su preparación. De preferencia aplicar con boquillas de gota fina.
El cultivo debe encontrarse en buen estado fitosanitario y nutricional y el suelo debe tener una humedad adecuada (en capacidad de campo).

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS L/ Cil. 200 L	P.C (días)	L.M.R. (ppm)
Tomate	Se recomienda la aplicación en: -Al inicio de la floración. -10-20 días después de la primera aplicación. -La tercera aplicación es opcional, dependiendo del desarrollo del cultivo, si las condiciones medioambientales no son favorables para el desarrollo de la fructificación.	0.30	N.A.	N.A.
Pimiento	Se recomienda los siguientes momentos de aplicación: - Al inicio del crecimiento vegetativo. - Al inicio de la floración - Al inicio del cuajado de frutos. - Durante el crecimiento de frutos.	0.2	N.A.	N.A.

P.C: Período de carencia L.M.R. Límite máximo de residuos NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda realizar hasta 4 aplicaciones/campaña, la época de aplicación será de acuerdo a la fenología del cultivo. Se considera una campaña, con una frecuencia de aplicación de 7- 10 días.
PERIODO DE REINGRESO:
Después de 12 horas.
FITOTOXICIDAD:
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.
COMPATIBILIDAD:
Es compatible con los plaguicidas de uso común, excepto con sustancias del tipo alcalino. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCIÓN

ETIQUETA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Longitud Literal 27 cm.

09 cm

Longitud de Color 28 cm.

Cyan Magenta Amarillo Negro Pantone 347 C

Longitud Total 28.9 cm.

Altura Total 13.5 cm.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido agroquímicos debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y si el contacto fuese directo con la piel, lave con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencia: SAMU 106
BIOGEN AGRO S.A.C. 01 6126565

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Ningún envase que haya contenido agroquímicos debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos 5 metros.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CYTOFIX®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Citoquininas ..... 24 g/L
Aditivos ..... csp 1L

Reg. RCP 105-SENASA

Titular del Registro, Formulador:
BIOGEN AGRO S.A.C.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565

Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da. Etapa, Ate. Lima - Perú
Telf.: 612-6565
R.U.C. Nº 20307150981

Fecha de Formulación:
Lote Nº:
Contenido Neto: **20 L**
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
CYTOFIX® es un Regulador de Crecimiento de Plantas, a base de citoquinina cuyo ingrediente activo es 6-Benzyladenine, la cual regula muchos aspectos importantes del desarrollo de las plantas en los órganos aéreos y subterráneos. También media las respuestas a factores extrínsecos variables, como las condiciones de luz en el brote y la disponibilidad de nutrientes y agua en la raíz, y tiene un papel en la respuesta al estrés biótico y abiótico. Fomenta la división celular en el fruto en desarrollo, lo que conduce a un mayor número de células en los frutos y la posibilidad de obtener frutos más grandes.
En conjunto, estas actividades contribuyen al ajuste de la regulación cuantitativa del crecimiento en las plantas.

CYTOFIX® Se aplica en mezcla con agua. Para la preparación, calibrar el volumen de agua a utilizar; en la mitad de agua disolver la dosis de **CYTOFIX®** a aplicar, agitar vigorosamente para homogenizar la mezcla y completar al volumen calculado para cubrir el área a tratar. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.
Se recomienda calibrar el equipo para obtener el gasto de agua adecuado, que permita cubrir el follaje y frutos totalmente.
La mezcla debe ser aplicada el mismo día de su preparación. De preferencia aplicar con boquillas de gota fina.
El cultivo debe encontrarse en buen estado fitosanitario y nutricional y el suelo debe tener una humedad adecuada (en capacidad de campo).

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS L/ Cil. 200 L	P.C (días)	L.M.R. (ppm)
Tomate	Se recomienda la aplicación en: -Al inicio de la floración. -10-20 días después de la primera aplicación. -La tercera aplicación es opcional, dependiendo del desarrollo del cultivo, si las condiciones medioambientales no son favorables para el desarrollo de la fructificación.	0.30	N.A.	N.A.
Pimiento	Se recomienda los siguientes momentos de aplicación: - Al inicio del crecimiento vegetativo. - Al inicio de la floración - Al inicio del cuajado de frutos. - Durante el crecimiento de frutos.	0.2	N.A.	N.A.

P.C: Período de carencia L.M.R. Límite máximo de residuos NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda realizar hasta 4 aplicaciones/campaña, la época de aplicación será de acuerdo a la fenología del cultivo. Se considera una campaña, con una frecuencia de aplicación de 7- 10 días.
PERIODO DE REINGRESO:
Después de 12 horas.
FITOTOXICIDAD:
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.
COMPATIBILIDAD:
Es compatible con los plaguicidas de uso común, excepto con sustancias del tipo alcalino. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCIÓN

ETIQUETA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Longitud Literal 27 cm.

09 cm

Longitud de Color 28 cm.

Cyan Magenta Amarillo Negro Pantone 347 C

Longitud Total 28.9 cm.

Altura Total 13.5 cm.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido agroquímicos debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y si el contacto fuese directo con la piel, lave con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencia: SAMU 106
BIOGEN AGRO S.A.C. 01 6126565

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Ningún envase que haya contenido agroquímicos debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos 5 metros.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CYTOFIX®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Citoquininas ..... 24 g/L
Aditivos ..... csp 1L

Reg. RCP 105-SENASA

Titular del Registro, Formulador:
BIOGEN AGRO S.A.C.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565

Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da. Etapa, Ate. Lima - Perú
Telf.: 612-6565
R.U.C. Nº 20307150981

Fecha de Formulación:
Lote Nº:
Contenido Neto: **200 L**
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
CYTOFIX® es un Regulador de Crecimiento de Plantas, a base de citoquinina cuyo ingrediente activo es 6-Benzyladenine, la cual regula muchos aspectos importantes del desarrollo de las plantas en los órganos aéreos y subterráneos. También media las respuestas a factores extrínsecos variables, como las condiciones de luz en el brote y la disponibilidad de nutrientes y agua en la raíz, y tiene un papel en la respuesta al estrés biótico y abiótico. Fomenta la división celular en el fruto en desarrollo, lo que conduce a un mayor número de células en los frutos y la posibilidad de obtener frutos más grandes.
En conjunto, estas actividades contribuyen al ajuste de la regulación cuantitativa del crecimiento en las plantas.

CYTOFIX® Se aplica en mezcla con agua. Para la preparación, calibrar el volumen de agua a utilizar; en la mitad de agua disolver la dosis de **CYTOFIX®** a aplicar, agitar vigorosamente para homogenizar la mezcla y completar al volumen calculado para cubrir el área a tratar. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.
Se recomienda calibrar el equipo para obtener el gasto de agua adecuado, que permita cubrir el follaje y frutos totalmente.
La mezcla debe ser aplicada el mismo día de su preparación. De preferencia aplicar con boquillas de gota fina.
El cultivo debe encontrarse en buen estado fitosanitario y nutricional y el suelo debe tener una humedad adecuada (en capacidad de campo).

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS L/ Cil. 200 L	P.C (días)	L.M.R. (ppm)
Tomate	Se recomienda la aplicación en: -Al inicio de la floración. -10-20 días después de la primera aplicación. -La tercera aplicación es opcional, dependiendo del desarrollo del cultivo, si las condiciones medioambientales no son favorables para el desarrollo de la fructificación.	0.30	N.A.	N.A.
Pimiento	Se recomienda los siguientes momentos de aplicación: - Al inicio del crecimiento vegetativo. - Al inicio de la floración - Al inicio del cuajado de frutos. - Durante el crecimiento de frutos.	0.2	N.A.	N.A.

P.C: Período de carencia L.M.R. Límite máximo de residuos NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda realizar hasta 4 aplicaciones/campaña, la época de aplicación será de acuerdo a la fenología del cultivo. Se considera una campaña, con una frecuencia de aplicación de 7- 10 días.
PERIODO DE REINGRESO:
Después de 12 horas.
FITOTOXICIDAD:
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.
COMPATIBILIDAD:
Es compatible con los plaguicidas de uso común, excepto con sustancias del tipo alcalino. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

ETIQUETA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL SENASA

PRECAUCIÓN

Longitud Literal 27 cm.

09 cm

Longitud de Color 28 cm.

Cyan Magenta Amarillo Negro Pantone 347 C

Longitud Total 22.7 cm.

Altura Total 12 cm.

CYTOFIX®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Citoquininas ..... 24 g/L
Aditivos ..... csp 1L

Reg. RCP 105-SENASA

Titular del Registro, Formulador:
BIOGEN AGRO S.A.C.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565

Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da. Etapa, Ate. Lima - Perú
Telf.: 612-6565
R.U.C. Nº 20307150981

Fecha de Formulación:
Lote Nº:
Contenido Neto: **500 mL**
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
-No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
-Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
-Ningún envase que haya contenido agroquímicos debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
-En caso de ingestión no inducir al vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.
-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
Teléfono de emergencia: SAMU 106
Tecnología Química y Comercio S.A 612-6565

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
-Ningún envase que haya contenido agroquímicos debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

PRECAUCIÓN

ETIQUETA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL SENASA

09 cm

Longitud Literal 20.4 cm.

Longitud de Color 21.8 cm.

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No almacenar ni transportar con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido agroquímicos debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Características del equipo y ropa de protección: Los operarios deberán llevar equipos y ropa protectora en perfectas condiciones.
Almacenamiento: Almacenar el producto en sus envases originales, etiquetado y debidamente cerrados en lugares secos y ventilados, bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.
No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencia:

SAMU: 106, BIOGEN AGRO SAC.: (01) 612-6565.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos 5 metros.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Instrucciones del lavado de los equipos de aplicación: Una vez terminado el trabajo, los equipos y utensilios de aplicación deberán lavarse prolijamente con abundante agua, llenando y vaciando los tanques por tres veces en lugares ya tratados. Disposición de envases vacíos: No reutilice los envases vacíos.
Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Manejo de derrames: En caso de derrames, absorba el producto inmediatamente con aserrín o tierra, recoja el material absorbente, colóquelo en una bolsa y entiérrelo en un lugar seguro. Limpie el área contaminada con agua.

CYTOFIX®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Reg. RCP 105-SENASA

Nombre común del ingrediente activo (ISO):
Citoquinina..... 24 g/L
Nombre químico (IUPAC)
N6-benzyladenine
Fórmula estructural:



N6-benzyladenine

Formula empírica: C12 H11 N5
Aspecto: Líquido
Color: Marrón oscuo
Olor: Olor característico
Densidad: 1,100 – 1,300 g/ml
pH = 2-3
Estabilidad en el almacenamiento: Es estable al menos por 24 meses en sus envases originales cerrados herméticamente a temperatura ambiente.
Inflamabilidad: No inflamable
Corrosividad: No corrosivo
Explosividad: No explosivo
Contenido de otros componentes: Aditivos
Presentaciones: Frascos de 250 ml, 500 ml, 1 L, 20, 200L.
Titular del Registro, Formulador:
BIOGEN AGRO S.A.C.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565
Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú
Telf.:612-6565

PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
CYTOFIX® es un Regulador de Crecimiento de Plantas, a base de citoquinina cuyo ingrediente activo es 6-Benzyladenine, la cual regula muchos aspectos importantes del desarrollo de las plantas en los órganos aéreos y subterráneos. También media las respuestas a factores extrínsecos variables, como las condiciones de luz en el brote y la disponibilidad de nutrientes y agua en la raíz, y tiene un papel en la respuesta al estrés biótico y abiótico. Fomenta la división celular en el fruto en desarrollo, lo que conduce a un mayor número de células en los frutos y la posibilidad de obtener frutos más grandes. En conjunto, estas actividades contribuyen al ajuste de la regulación cuantitativa del crecimiento en las plantas.

CYTOFIX® Se aplica en mezcla con agua. Para la preparación, calibrar el volumen de agua a utilizar; en la mitad de agua disolver la dosis de **CYTOFIX®** a aplicar, agitar vigorosamente para homogenizar la mezcla y completar al volumen calculado para cubrir el área a tratar. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.
Se recomienda calibrar el equipo para obtener el gasto de agua adecuado, que permita cubrir el follaje y frutos totalmente.
La mezcla debe ser aplicada el mismo día de su preparación. De preferencia aplicar con boquillas de gota fina.
El cultivo debe encontrarse en buen estado fitosanitario y nutricional y el suelo debe tener una humedad adecuada (en capacidad de campo)

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS L/ Cil. 200 L	P.C (días)	L.M.R. (ppm)
Tomate	Se recomienda la aplicación en: -Al inicio de la floración. -10-20 días después de la primera aplicación. -La tercera aplicación es opcional, dependiendo del desarrollo del cultivo, si las condiciones medioambientales no son favorables para el desarrollo de la fructificación.	0.30	N.A.	N.A.
Pimiento	Se recomienda los siguientes momentos de aplicación: - Al inicio del crecimiento vegetativo. - Al inicio de la floración. - Al inicio del cuajado de frutos. - Durante el crecimiento de frutos.	0.2	N.A.	N.A.

P.C: Período de carencia L.M.R. Límite máximo de residuos NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda realizar hasta 4 aplicaciones/campaña, la época de aplicación será de acuerdo a la fenología del cultivo. Se considera una campaña, con una frecuencia de aplicación de 7- 10 días.

PERIODO DE REINGRESO:
Después de 12 horas.

FITOTOXICIDAD:
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

ETIQUETA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL SENASA
ETIQUETA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL SENASA