

$14.0 \pm 0.3 \text{ cm}$ 1.5 ± 0.3 1.5 ± 0.3

NEMATRIX^{BIO}

NEMATICIDA AGRÍCOLA

Composición:
 Extracto de canela 800 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Nº de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

2MBIO CO., LTD.
35-20, Hakhyeon-gil, Anjung-eup,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Korea.

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

NEMATRIX BIO es un fungicida biológico que actúa por contacto e ingestión. Activa inhibiendo la actividad neuromuscular reduciendo con ello la capacidad de movimiento. Al inhibir la capacidad de movimiento, inhibe al mismo tiempo otros aspectos como la infección, eclosión y alimentación. Inhibe la alimentación y retarda e inhibe la muerte, afectando directamente la formación de los juveniles (J2). Tiene también efecto sobre los huevos, produciendo finalmente una marcada reducción en el grado de los nódulos en las raíces de las plantas y por ende una rápida recuperación.

NEMATRIX BIO se aplica al suelo en forma de riego. Para obtener mejores resultados se recomienda adicionar la dosis recomendada en un balde con un tercio del volumen de agua luego vaciar al recipiente dándole completamente la cantidad de agua.

NEMATRIX BIO se aplica al suelo mediante aplicación drench o vía sistema de riego.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		
Papa	Nemátodo del quiste	<i>Globodera pallida</i>	2.5	-	N.A.	N.A.
Pimiento	Nemátodo del nudo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.0-2.0	-	N.A.	N.A.
Platano	Nemátodo del nudo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	-	5.0-8.0	N.A.	N.A.
Vid	Nemátodo del nudo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	-	5-10	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carência N.A.: Não Aplicável

Aplique **NEMATIX BIO®** luego de evaluar previamente a la plaga, cuando su densidad lo justifique. Para el cultivo de vid, aplicar 02 veces por campaña/huero con un intervalo de 7 días, a partir de pre floración o floración. Para el cultivo de papa, se recomienda aplicar 1 vez por campaña/huero, cuando la plaga sea abundante y/o se observe daño evidente en las plantas. Para el cultivo de maíz, aplicar 01 vez por campaña/huero, cuando la densidad sea 400 Lts. Este producto se eliza contra los individuos adultos de *Globobera pallida*. Para el cultivo de pimiento, realizar 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año, previa evaluación de la plaga. Para el cultivo de Pitahaya, se recomienda 02 aplicaciones por campaña considerando 1 campaña al año con un intervalo de 14 a 21 días previa evaluación de la plaga. Utilizar la mayor dosis cuando la densidad de población de la plaga sea alta y las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo, mientras que se usa la menor dosis cuando las poblaciones estén en sus primeras etapas de infestación.

PERIODO DE REINGRESO:
Puede reingresar al campo 12 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

NEMATRIX BIO® es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción ácida y alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

Fitotoxicidad:
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.