

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Mantener el producto en su envase original.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón durante 5-10 minutos.
- En caso de ingestión accidental, no inducir al vómito; dar de beber agua en grandes cantidades.
- No contiene antídoto específico, se recomienda tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a:

SAMU: 106

NOVALTY: (01) 688-2986

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- En caso de derramarse recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.



PANCOSO

PLAGUICIDA BIOLOGICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Bacillus subtilis 100 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. N° 0179-SENASA-PBA-ACBM

TITULAR DE REGISTRO: NOVALTY S.A.C.

Formulado por:

Rio Viejo 57-59, Polígono Industrial La Isla,
41703 Dos Hermanas, Sevilla, España
Teléfono: +34 954 930 942
E-mail: info@trichodex.com

Importador por:



Av. La Floresta N 265 Urb. Chacarilla
del Estanque San Borja, Lima - Perú
Teléfono: (01) 688-2986
E-mail: calidad@novaltyperu.com

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

N° de lote:

Contenido neto: 1 LT

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PANCOSO es una solución fungicida de amplio espectro a base de *Bacillus subtilis*, usado para combatir diferentes enfermedades con muy poca posibilidad de que los patógenos desarrollen resistencia.

Crea una zona de inhibición en la hoja previniendo el ataque de patógenos.

PANCOSO posee acción preventiva y curativa, impidiendo la instalación del hongo y evitando su desarrollo. Presenta múltiples modos de acción para invadir y atacar hongos fitopatógenos.

MODO DE EMPLEO:

Diluir la dosis indicada en un recipiente hasta la mitad de agua, luego llenar recipiente hasta completar de agua, agitar y luego se procede a realizar la aplicación en el cultivo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha	días	ppm
ESPÁRRAGO	Mancha del beral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.8	2 - 3	NA	NA
PALTO	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.6	3 - 4	NA	NA
VID	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.6	2	NA	NA
	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.6 - 0.8	2 - 3	NA	NA
ARÁNDANO	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.6	-	NA	NA

P.C.: Periodo de carencia LMR: Límites máximos de residuos NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Disolver en 100 litros de agua la solución, luego completar hasta lo recomendado.

ESPÁRRAGO: Número de aplicaciones por campaña: 3

Época de aplicación: al inicio de la enfermedad

Número de campañas por año: 1

Intervalo entre aplicaciones: 10-15 días

PALTO: Número de aplicaciones por campaña: 3

Época de aplicación: al inicio de la enfermedad

Número de campañas por año: 1

Intervalo entre aplicaciones: 7 - 15 días

VID: Número de aplicaciones por campaña: 4

Época de aplicación: a la presencia de la enfermedad

Número de campañas por año: 1

Intervalo entre aplicaciones: 7 - 15 días

ARÁNDANO: Número de aplicaciones por campaña: 3

Época de aplicación: al inicio de la enfermedad

Número de campañas por año: 1

Intervalo entre aplicaciones: 7 - 15 días

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después que los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de reacción alcalina, ni cúpricos.

FITOTOXICIDAD:

PANCOSO, no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

