

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la casa-habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
- Realice la aplicación siguiéndola dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo Químico: Cúprico**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente a un Centro Médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- Si se produce el contacto con los ojos lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, también bajo los párpados, y acudir inmediatamente al médico.
- En caso de contaminación de la piel, retirar toda la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.
- En caso de inhalación apartar al paciente del lugar de exposición mantenerlo caliente y en reposo. Controle la respiración y si fuera necesario brindar respiración artificial.
- En caso de ingestión: inducir al vomito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente, obtener asistencia médica o trasladar al paciente a un centro médico.

**Teléfonos de emergencia:**

**CICOTOX:** 0800-13040 ó 328 7398; Centro Nacional de Emergencias de ESSALUD: 0801-10200

**CISPROQUIM:** 0800-50847; ITAGRO S.A.: (01) 349-6805

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Altamente peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua con un ancho de 5 cm.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o aditivos del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame de este producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# FLOXIL<sup>cu</sup>

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**Composición:**

Sulfato de cobre pentahidratado: 250 g/l  
 Aditivos: CSP 1 L

**Reg. PQUA N° 642 - SENASA**

**Titular del registro:**

INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.

**Importado y  
Distribuido por:**

**ITAGRO S.A.**  
 INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.  
 Av. Javier Prado Este Nro. 6210 Int. 201  
 (Edificio Park Office la Molina), La Molina  
 Lima - Perú. Tel. 349 6805

**Formulado por:**

**QUINAGRO**  
 Laboratorio para la Salud y la Agricultura S.A.  
 San Pedro de Poás S/N, Avenida  
 Tilar-2448-4451 - Tlf: 2448-5196  
 Costa Rica

**Contenido neto** : 200 L  
**Lote N°** :  
**Fecha de formulación** :  
**Fecha de vencimiento** :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**Floxil cu** es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Actúa contra diversos hongos fitopatógenos.

Aplicar a cuello de planta o al sistema de riego tecnificado.

Se toma la cantidad de **Floxil cu** recomendado. Llenar el tanque de aplicación a la altura de 3/4 del volumen con agua. luego dejar caer lentamente el **Floxil cu** dentro del tanque, con el sistema de agitación en intenso movimiento. Después el volumen requerido con agua.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**  
**USOS Y DOSIS:**

| CULTIVO   | NOMBRE COMÚN                      | NOMBRE CIENTÍFICO                            | DOSIS<br>L/cilindro<br>200 L. | P.C<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Espárrago | Ascariosis                        | <i>Fusarium oxysporum</i>                    | 0.5 - 1.0                     | 10            | 5               |
| Alto      | Muerte regresiva                  | <i>Lasiodiplodia theobromae</i>              | 0.55-0.75                     | 14            | 20              |
| Cebolla   | Alternariosis                     | <i>Alternaria porri</i>                      | 0.5                           | 7             | 5               |
| Arándano  | Alternaria                        | <i>Alternaria alternata</i>                  | 0.5                           | 1             | 5               |
| Papa      | Alternaria                        | <i>Alternaria solani</i>                     | 0.5                           | 1             | 5               |
| Arroz     | Podredumbre de la vaina del arroz | <i>Gaeumannomyces graminis var. graminis</i> | 0.3                           | 7             | 10              |
| Arándano  | Muerte regresiva                  | <i>Lasiodiplodia theobromae</i>              | 0.5                           | 7             | 5               |

PC: Periodo de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.

Realizar un máximo de una aplicación por campaña al año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No entre al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con productos de marcada reacción alcalina, como azufres, aceites y otras inorgánicas.

**FITOTÓXICIDAD:**

No es fitotóxico a la dosis y uso recomendado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

