

20.00 cm

0.50 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión. - Conservar el producto en el envase original bien tapado y etiquetado. - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. - No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. - Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Quinazoline. - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. - En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones. - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. - En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y bañarse con abundante agua y jabón. - En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. - Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático. - **Teléfonos de emergencia:** SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos. - Peligroso para abejas. - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. - En caso de derrames el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Minervua

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARACIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Fenazaquin 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° -SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO., LTD.
N 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009.
CHINA
Teléfono: +86 (0) 25 83303203.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 20 L

N de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MINERVA es un acaricida que actúa por contacto e ingestión. Tiene actividad en insectos móviles y efecto ovicida. En ácaros previene la eclosión de huevos y controla todos sus estados: huevos, ninfas y adultos.

MINERVA se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (mL/cil)	PC (días)	LMR (p.p.m.)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PALTO	Arañita roja	<i>Oligonychus punicae</i>	100	49	0.01

PC: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar con buena cobertura del follaje de manera que la aplicación llegue al envés de las hojas; durante el desarrollo vegetativo y la formación y maduración de los frutos, especialmente bajo condiciones de verano. Se recomienda aplicar 1 vez por campaña y considerando 1 campaña/año, a fin de evitar la resistencia de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

MINERVA es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de reacción neutra. Es incompatible con agentes alcalinos fuertes y oxidantes, aminas y productos a base de cobre. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico al cultivo recomendado, si se aplica en los momentos y a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Versión 01

0.20 cm

2.10 cm

0.20 cm

0.50 cm

0.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

14.00 cm