

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con agua fría
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y bríndele una posición confortable para respirar
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático

#### TELÉFONO DE EMERGENCIA:

Emergencia SAMU: 106  
TITULAR DEL REGISTRO: 992-773-871

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos
- No lave los equipos de aplicación en cuerpos de agua como lagos, ríos, acequias, etc
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin

# DANEMIN

EXTRACTO VEGETAL

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

#### Composición:

Aceite de Neem ..... 80 % p/v  
Azadirachtina ..... 0.112 % p/v  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L.

Reg. N° XXX-SENASA-PBA-EV

Titular del Registro:

**PEDRO PABLO MARTINEZ MORENO**

RUC 10476547763

Dirección: Jiron Lomas de las Lilas 147, Santiago de Surco, Lima,  
Lima

Teléfono: 992-773-871

Formulador: **Operadora Markher, S de R.L de C.V.**

Dirección: Periférico Poniente #2100 – J Col. Lomas del Colli,

Zapopan, Jalisco.

País: México

Teléfono: +52 33 3629 9737

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1000 Litros

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**DANEMIN**, es un insecticida compuesto por aceite de neem obtenido del árbol de Azadirachta indica. Actúa regulando el crecimiento de los insectos al interferir en la producción de la hormona que regula la muda (ecdisona) impidiendo el desarrollo y la salida del huevo, así como el desarrollo de las larvas.

**DANEMIN** se aplica con equipo pulverizador a bajo volumen. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia de pH 4.0-5.0 hasta la mitad y luego añada el producto a la dosis recomendada revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado. Aplicar inmediatamente después de preparar la mezcla.

#### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO  | PLAGA        |                             | DOSIS<br>(L./Ha.) | LMR<br>(ppm) | PC<br>(días) |
|----------|--------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|          | Nombre común | Nombre científico           |                   |              |              |
| Arándano | Mosca blanca | <i>Aleurodicus juleikae</i> | 1                 | N.A.         | N.A.         |

LMR: Límite Máximo de Residuos | P.C: Periodo de Carenia | N.A.: No aplica

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación y ante la presencia de la plaga
- Se recomienda 4 aplicaciones/campaña/año, considerando un intervalo de 6-8 días

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo, hasta después de 12 horas de haber aplicado el producto

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con todos los agroquímicos de uso común, pero incompatible con K. Mg y Ca.

#### FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

