Presentación de caja de 1 kg

14.8 cm

7.6 cm

1.5 cm

23 cm

Bupro-Forte

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Bupro-Forte

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Buprofezin ..... 250 g/kg
Aditivos.....c.s.p..... 1 kg

Reg. PQUA N° 3271-SENASA

Titular del registro, Importador y Distribuidor:
NGC AGROSCIENCES PERÚ S.A.C
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,
Miraflores, Lima, Perú.
Teléfono: (01) 222-2795

Formulado por:
FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 1 kg

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® Marca registrada de Farmex S.A.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Titular del registro, Importador y Distribuidor:
NGC AGROSCIENCES PERÚ S.A.C
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,
Miraflores, Lima, Perú.
Teléfono: (01) 222-2795

Formulado por:
FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

5.4 cm

14.8 cm

7.6 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Thiadiazine.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico. No dar nada por vía oral si el paciente se encuentra inconsciente.
- En caso de irritación ocular. Lavar los ojos con los párpados levantados, con abundante agua durante 15 minutos. Remover lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de irritación dermal: Remover toda la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Retirar al paciente del sitio de intoxicación, llevarlo a un lugar ventilado y dejarlo en reposo. Si presenta dificultades para respirar brindarle respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico para este producto. El tratamiento es sintomático.
- **Teléfonos de Emergencia:**
  SAMU: 106
  NGC AGROSCIENCES PERÚ S.A.C: (01) 222-2795.

3.8 cm

14.8 cm

7.6 cm

15.3 cm

ABRIR AQUÍ

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Bupro-Forte

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BUPRO-FORTE es un insecticida no sistémico, con acción por contacto y estomacal. Es un inhibidor de la síntesis de quitina, suprime el proceso de ecdisis en el insecto inmaduro. **BUPRO-FORTE** es un insecticida que se aplica en pulverizaciones en mezcla con agua, siendo recomendable hacer una pre-mezcla en un volumen menor de agua. Aplicar con equipos de aspersión terrestre, en forma uniforme.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	CULTIVOS		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/cil	kg/ha	(días)	(ppm)
Mandarina	Queresa redonda	*Selenaspidus articulatus*	200	1	14	1
Naranja	Queresa común	*Lepidosaphes beckii*	200	1	14	1
	Mosca blanca	*Aleurothrixus floccosus*	100	0.5	14	1
Olivo	Queresa móvil	*Praelongorthezia olivicola*	200	1	14	5
Melocotonero	Queresa blanca	*Pseudoaulacaspis pentagona*	200	1	14	0.7
Tomate	Queresa blanca	*Bemisia tabaci*	175	0.35	14	1
Palto	Queresa coma amarillenta	*Fiorinia fioriniae*	200	1	45	0.05
Mango	Queresa pulverulenta	*Protopulvinaria pyriformis*	200	1	14	0.1
Vid	Mosca blanca	*Bemisia tabaci*	-	1	30	1
	Cochinilla harinosa	*Planococcus citri*	200	1	30	1

PC: Período de carencias en días. **LMR:** Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se considera hasta dos (02) aplicaciones por campaña como máximo y una frecuencia de aplicaciones de 21 días.

PERÍODO DE REINGRESO
No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas orgánicos de síntesis con la excepción de productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD
BUPRO-FORTE no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Bupro-Forte

5.4 cm

14.8 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depósitela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

3.8 cm

7.6 cm

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA