

Referencia 12 - caja

23 cm

1.5 cm

7.6 cm

14.8 cm

Bupro-Forte

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Bupro-Forte

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Buprofezin ..... 250 g/kg  
Aditivos.....c.s.p..... 1 kg

Reg. PQUA N° xxxx-SENASA

Titular de registro: FARMEX S.A.

Formulado por:  
FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERÚ  
Teléfono: (01) 630-6400  
www.farmex.com.pe



Importador y Distribuidor:

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.  
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,  
Miraflores, Lima, Peru  
Teléfono: (01) 222-2795



CONTENIDO NETO: 1 kg

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de Farmex S.A.

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

Titular de registro y formulador:  
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERÚ  
Teléfono: (01) 630-6400  
www.farmex.com.pe



Importador y Distribuidor:  
NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.  
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,  
Miraflores, Lima, Peru  
Teléfono: (01) 222-2795



3.8 cm

7.6 cm

14.8 cm

POLVO MOJABLE (WP)

INSECTICIDA AGRÍCOLA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Bupro-Forte

15.3 cm

ABRIR AQUÍ →

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**BUPRO-FORTE** es un insecticida no sistémico, con acción por contacto y estomacal. Es un inhibidor de la síntesis de quitina, suprime el proceso de ecdisis en el insecto inmaduro. **BUPRO-FORTE** es un insecticida que se aplica en pulverizaciones en mezcla con agua, siendo recomendable hacer una pre-mezcla en un volumen menor de agua. Aplicar con equipos de aspersión terrestre, en forma uniforme.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVOS     | CULTIVOS                 |                                   | DOSIS |       | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|
|              | NOMBRE COMÚN             | NOMBRE CIENTÍFICO                 | g/cil | kg/ha |              |              |
| Mandarina    | Queresa redonda          | <i>Selenaspidus articulatus</i>   | 200   | 1     | 14           | 1            |
|              | Naranja                  | <i>Lepidosaphes beckii</i>        | 200   | 1     | 14           | 1            |
| Olivo        | Mosca blanca             | <i>Aleurothrixus floccosus</i>    | 100   | 0.5   | 14           | 1            |
|              | Queresa móvil            | <i>Praelongorthezia olivicola</i> | 200   | 1     | 14           | 5            |
| Melocotonero | Queresa blanca           | <i>Pseudoaulacaspis pentagona</i> | 200   | 1     | 14           | 9            |
| Tomate       | Queresa blanca           | <i>Bemisia tabaci</i>             | 175   | 0.35  | 1            | 1            |
| Palto        | Queresa coma amarillenta | <i>Fiorinia fioriniae</i>         | 200   | 1     | 45           | 0.3          |
| Mango        | Queresa pulverulenta     | <i>Protopulvinaria pyrifomis</i>  | 200   | 1     | 14           | 0.1          |
|              | Mosca blanca             | <i>Bemisia tabaci</i>             | -     | 1     | 30           | 1            |
| Vid          | Cochinilla harinosa      | <i>Planococcus citri</i>          | 200   | 1     | 30           | 1            |

**PC:** Período de carencias en días. **LMR:** Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se considera hasta dos (02) aplicaciones por campaña como máximo y una frecuencia de aplicaciones de 21 días.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas orgánicos de síntesis con la excepción de productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

**BUPRO-FORTE** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



5.4 cm

14.8 cm

7.6 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



3.8 cm

7.6 cm

Bupro-Forte