

DANTOTSU® 50 WG
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:
Clothianidin.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 081-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
SMTM PERU S.A.C
Av. Circunvalación Del Club Golf Los Incas N° 208,
Interior 705-B, TORRE III,
Urbanización Club Golf Los Incas
Santiago de Surco. Lima, Perú

FORMULADOR:
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
7-1,Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, 103-6020, Japan.

IMPORTADOR -DISTRIBUIDOR:



We create chemistry

BASF Peruana S.A.
Av. O. R. Benavides 5915 – Callao 1
Casilla 3911 Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519

Fecha de Formulación:
Lote N°:
CONTENIDO NETO: 1Kg.
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y
APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original. Etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas o medicinas tanto de uso humano como animal.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Cloronicotinilo
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, si el contacto fuese con la piel, lavarse con agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental inducir vómito y no suministrar nada.
- Nota al médico: Tratar sintomáticamente. No tiene antídoto específico.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE
INTOXICACIÓN

Teléfono del Titular: 01 421-4811
SAMU: 106

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Dantotsu 50 WG es un insecticida con actividad altamente sistémica en la planta, es absorbido rápidamente por las hojas y raíces de las plantas. Controla los insectos por contacto e ingestión afectando su sistema nervioso. (Modo de Acción IRAC 4A).
MODO DE EMPLEO:
Poner la dosis recomendada en 4 litros de agua, luego verter la mezcla en el equipo de aplicación y completar con agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	g/ha	g/200 L		
Arroz	Mosca minadora del arroz	Hydrellia wirthi	-	100 -110	14	0.5
	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Tagosodes orizicolus	-	150		
Espárrago	Prodiplosis	Prodiplosis longifolia	400	160	30	0.04
Mandarina	Minador de hoja	Phyllocnistis citrella	240 - 400	60 -100	14	0.07
Papa	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	140 - 280	40 - 60	14	0.05
	Gorgojo de los Andes	Premnotrypes suturalis	-	200 - 300	14	0.2
Pimiento	Mosquilla de los brotes	Prodiplosis longifolia	450 - 500	-	33	0.5
	Mosca blanca	Bemisia tabaci	100 - 140	40 - 60	7	0.05
Tomate	Mosquilla de los brotes	Prodiplosis longifolia	300 - 400	-		
Vid	Cochinilla harinosa (Aplicación foliar)	Dysmicoccus brevipes	500	-	30	0.7
	Cochinilla harinosa (Aplicación suelo)	Planococcus citri	1000	-	30	
Café	Broca del fruto	Hypothenemus hampei	150	-	45	0.05

PC= Período de carencia LMR= Límite Máximo de Residuos nd=No determinado
Los períodos de carencia indicados en la etiqueta son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.
Gasto de agua aplicable en café: 500 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar Dantotsu 50 WG al inicio de la infestación de la plaga.
Efectuar un máximo, de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo entre 10 a 14 días.
En espárrago, aplicar solo al follaje, nunca sobre turiones en cosecha.
En papa, para el control de Gorgojo de los Andes, iniciar la aplicación en la emergencia de las plantas, mojando bien el cuello o tercio inferior de las plantas, realizar buena cobertura al follaje.
En vid, para el control de cochinilla harinosa vía suelo aplicar en drench en la zona radicular en la dosis indicada, antes de la etapa de floración, regar antes de aplicar y posteriormente.
En café realizar una aplicación por campaña. Realizar la aplicación con fruto formado y previa evaluación de presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas
COMPATIBILIDAD: Dantotsu 50 WG es compatible con insecticidas y fungicidas en general.
Se recomienda rotar a las aplicaciones con insecticidas de diferente grupo químico para evitar resistencia y mantener su eficacia.
FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos
RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.
Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL
PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN
DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la caja o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes con agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No aplicar en los suelos con Napa Freática superficial.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Utilizar el agua del lavado sobre el cultivo que se está aplicando.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

