

ZONA DE TROQUELADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Kryptón®

50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Eamectin benzoato..... 50 g/kg
 Aditivos..... c.s.p... 1 kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es letal, no ingerir. - Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión. - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Avermectina.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco monitorear que no exista dificultad para respirar. Si existe practicar respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. - No aplicar en época de floración. - No aplicar en presencia de polinizadores. - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. - Aplicar temprano en las mañanas o muy por las tardes. Evitar la deriva por el viento. - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. - Tóxico para organismos acuáticos. - No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - Peligroso para los animales domésticos, la fauna y flora silvestre. - No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KRYPTON® 50 WG es un insecticida de la familia de las avermectinas con actividad transaminar utilizado para el control de larvas de lepidópteros y otros minadores de hojas. **KRYPTON® 50 WG** actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-larvicida. **KRYPTON® 50 WG** se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis recomendada en 1/3 del volumen de agua, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado. Se puede aplicar por vía terrestre con pulverizadora, atomizadora o equipo con enganche de 3 puntos en tractor.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100	30	0.01
ESPÁRRAGO	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200	30	0.01
PIMIENTO	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	200	7	0.02

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de arroz se recomienda un máximo de 2 aplicaciones/campaña con una frecuencia mínima de 14 días entre ellas y considerando 2 campañas/año; y en los cultivos de espárrago y pimiento se recomienda un máximo de 3 aplicaciones/campaña con una frecuencia mínima de 7 días entre ellas y considerando una sola campaña/año. En todos los cultivos la época o momento de aplicación es a la aparición de las primeras larvas, cuando se tenga un 5% de plantas infestadas en campo.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurrido 24 horas del tratamiento.

COMPATIBILIDAD

KRYPTON® 50 WG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

FITOTOXICIDAD

KRYPTON® 50 WG no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
 San Isidro, Lima 27 - PERU
 Teléfono: (01) 630-6400.
 www.farmex.com.pe

NO CORROSIVO

© Marca registrada de Farmex S.A.

Reg. PQUA N° 1138 - SENASA

Formulado por:

NORCHEM JIANGSU CORPORATION
 West Tower, Fortune International Building
 N° 359 Hongwu Road, Nanjing
 CHINA

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

CONTENIDO NETO: 2 kg**NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO



30.00 centímetros

4.50 cm

Versión 1

0.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Kryptón®

50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Eamectin benzoato..... 50 g/kg
 Aditivos..... c.s.p... 1 kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es letal, no ingerir. - Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión. - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Avermectina.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco monitorear que no exista dificultad para respirar. Si existe practicar respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. - No aplicar en época de floración. - No aplicar en presencia de polinizadores. - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. - Aplicar temprano en las mañanas o muy por las tardes. Evitar la deriva por el viento. - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. - Tóxico para organismos acuáticos. - No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - Peligroso para los animales domésticos, la fauna y flora silvestre. - No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KRYPTON® 50 WG es un insecticida de la familia de las avermectinas con actividad translinar utilizado para el control de larvas de lepidópteros y otros minadores de hojas. **KRYPTON® 50 WG** actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-larvicida. **KRYPTON® 50 WG** se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis recomendada en 1/3 del volumen de agua, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado. Se puede aplicar por vía terrestre con pulverizadora, atomizadora o equipo con enganche de 3 puntos en tractor.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100	30	0.01
ESPÁRRAGO	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200	30	0.01
PIMIENTO	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	200	7	0.02

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de arroz se recomienda un máximo de 2 aplicaciones/campaña con una frecuencia mínima de 14 días entre ellas y considerando 2 campañas/año; y en los cultivos de espárrago y pimiento se recomienda un máximo de 3 aplicaciones/campaña con una frecuencia mínima de 7 días entre ellas y considerando una sola campaña/año. En todos los cultivos la época o momento de aplicación es a la aparición de las primeras larvas, cuando se tenga un 5% de plantas infestadas en campo.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurrido 24 horas del tratamiento.

COMPATIBILIDAD

KRYPTON® 50 WG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

FITOTOXICIDAD

KRYPTON® 50 WG no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
 San Isidro, Lima 27 - PERU
 Teléfono: (01) 630-6400.
 www.farmex.com.pe

NO CORROSIVO

© Marca registrada de Farmex S.A.

Reg. PQUA N° 1138 - SENASA

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
 N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
 Song Jiang District, Shanghai
 CHINA

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

CONTENIDO NETO: 2 kg**NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO



0.50 centímetros

30.00 centímetros

4.50 cm

Versión 1

0.50 cm