

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderadamente irritante al tracto respiratorio.
- Tóxico por ingestión.
- Es irritante a los ojos y a la piel.
- Puede causar reacciones alérgicas a la piel, es un sensibilizante cutáneo.
- No exponer a las mujeres embarazadas en la mezcla ni en la aplicación del producto debido al contenido de xileno.
- Usar equipo de protección ocular, dérmica y traje de seguridad completo.
- No reutilizar envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Compuesto orgánico

- En caso de intoxicación oral o inhalatoria llamar o llevar al paciente inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Lleve al paciente al médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente o específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.
- Nota al médico: no tiene antídoto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

PROCITRUS: 224-9026 / 226-1952

SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas o artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar por las mañanas para evitar la deriva por el viento.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ARGENFRUT SUPREME GREEN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA, ACARICIDA Y FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Aceite mineral 837 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N°2619- SENASA

Titular de Registro: PROCITRUS

Av. Nicolás Arriola 314 - Of. 903,
La Victoria (Lima 13) Perú.
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952



Formulador: GULF OIL ARGENTINA S.A.

Belisario Roldán N°2601 (1744) La Rreja -
Moreno Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 237 463 3331
Fax: Interno N°1
e-mail: goa@gulfoil.com.ar



Importador y Distribuidor: PROCITRUS

Av. Nicolás Arriola 314 - Of. 903,
La Victoria (Lima 13) Perú.
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952

Contenido Neto: 1000 L

N° de Lote

F. de Form.

F. de Venc.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- ARGENFRUT SUPREME GREEN es usado como insecticida, acaricida y fungicida, para el control de queresas, queresas coma, araña roja, oidium y Cladosporium de acuerdo a lo recomendado en el cuadro de usos.
- ARGENFRUT SUPREME GREEN actúa por contacto produciendo la muerte del insecto por asfixia. Dado su poder disolvente de la quitina que recubre los desoves de los insectos, posee un marcado efecto ovicida previniendo de esta manera las reinfestaciones.
- Se recomienda aplicar en aspersión foliar con cualquier equipo de aplicación terrestre o aéreo, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas. Para ello, realizar una adecuada calibración del equipo y ajustar el gasto de agua según la canopia.
- **Uso complementario:** ARGENFRUT SUPREME GREEN debido a su naturaleza y componentes, se puede usar como "coadyuvante" de otros plaguicidas agrícolas, para lo cual se deberá mezclar a una dosis de 0.5-0.8% con el producto de su elección. Haga una prueba de compatibilidad previa y revise en las indicaciones de compatibilidad con otros plaguicidas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA / ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	%		
Palto	Queresas	<i>Florinia florinae</i>	20 - 33	1.0 - 1.5	NA	NA
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	6 - 15	1.0 - 1.5	NA	NA
Limón	Queresas coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	50 - 75	1.25	NA	NA
	Araña roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	50 - 75	1.25	NA	NA
Naranja	Queresas coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	50 - 75	1.25	NA	NA
	Araña roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	50 - 75	1.25	NA	NA
Mandarina	Queresas coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	50 - 75	1.25	NA	NA
	Araña roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	50 - 75	1.25	NA	NA
	Mancha de hoollín	<i>Cladosporium ramotenellum</i>	45 - 55	1.0 - 1.2	NA	NA

Para el cultivo de mandarina se considera un gasto de agua de 4500 L/Ha.

P.C. Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para los cultivos de mandarina, naranja y limón, se recomienda realizar al menos 4 aplicaciones por campaña, considerando una campaña al año.

En el caso de *Cladosporium*, el intervalo de aplicación, debe ser de 15 a 20 días dependiendo de la presión de la enfermedad.

Para el cultivo de vid se recomienda realizar 3 aplicaciones por campaña y para el cultivo de palto realizar 2 aplicaciones por campaña, considerando una campaña al año, la frecuencia de aplicación debe ser de 15 a 30 días, para ambos cultivos.

ARGENFRUT SUPREME GREEN se puede usar sin restricciones en cualquier época del año (verano – invierno).

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas hasta 12 horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ARGENFRUT SUPREME GREEN es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con azufre, carbaryl, captan, cyhexatin, propargite y otros compuestos que contengan azufre.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis indicadas.

La continuidad de una aplicación de ARGENFRUT SUPREME GREEN a una aplicación previa de azufre u otro compuesto que lo contenga, puede producir fitotoxicidad. En este caso, respetar un intervalo mínimo entre aplicaciones de 15 a 20 días.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

