

_____ **27.50 cm** _____

INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Magister® 200 SC es un acaricida de contacto que actúa por contacto e ingestión. Afecta al metabolismo de los ácaros inhibiendo la cadena de transporte de electrones del complejo mitocondrial, produciendo paralización de centros nerviosos hasta causar la muerte del ácaro. Pertenecer al Grupo 21 del IRAC.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

P.C.: Período de Carencia LMR: Límite máximo de residuos

Magister® 200 SC debe aplicarse durante el desarrollo vegetativo y evitar hacer aplicaciones durante la floración; aplicar para mandarina y palto como máximo una vez por campaña al año. Para el cultivo de vid, fresa y naranja, realizar 1 aplicación por campaña al año.

Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación para reingresar al campo. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

Magister® 200 SC es compatible con aceites agrícolas y otros plaguicidas comúnmente usados sin mostrar síntomas de fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Contenido neto: 1 L
Fecha de vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

**MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS**

PELIGRO

0,50 cm

VIGENCIA: ____ / ____ / ____

USO:

APROBADO POR:

SELLO

OBSERVACIONES: