

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# RIDOWN FULL

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**HERBICIDA AGRICOLA****CONCENTRADO SOLUBLE (SL)****COMPOSICIÓN:**

Glifosate (sal isopropilamina).....480 g/L  
 (Equivalente a 356 g/L Glifosato acido)  
 Aditivos.....c.s.p. 1L

PQA N° -SENASA

**TITULAR DE REGISTRO:****RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702 Urb. El Rosedal – Lima – Lima – Miraflores  
 Teléfono: (511) 639-9311

**FORMULADOR:****SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.**

Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China  
 Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231  
 E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com  
 www.rainbowagro.com

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:****SOLANDINA PERU S.A.C.**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702 Urb. El Rosedal – Lima – Lima – Miraflores  
 Teléfono: +51 992 763 127

**Contenido Neto: 3.5 L**

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

130mm

130mm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico del producto: Fosfonoglicina
- En caso de ingestión: no provocar el vómito. Acudir al médico llevando el envase o la etiqueta del producto. No administrar por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Lave con abundante agua y acuda al médico, llevando el envase con la etiqueta del producto.
- En caso de contacto con la piel: Lave con abundante agua y jabón. Si hubiera irritación, acudir al médico.
- En caso de inhalación: mover a la persona a un lugar aislado.
- Este producto no tiene antídoto específico disponible. El tratamiento es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **RIDOWN FULL** es un herbicida post-emergente para el control de malezas de hoja ancha, gramíneas anuales y perennes indicadas en el cuadro de uso.
- No tiene efecto residual, al entrar en contacto con el suelo se inactiva. Los efectos visibles de su acción contra las malezas anuales ocurren entre los 2 a 4 días de la aplicación.
- Agitar el frasco antes de mezclarlo con el agua.
- Se puede aplicar con cualquier equipo convencional terrestre.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106  
RAINBOW AGROSCIENCIAS: 01- 639-9311

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**



**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico			
Mandarina	Coquito Gramma dulce Gramma china Cadillo	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Cenchrus echinatus</i>	2-3	7	0.2
Vid	Coquito Gramma dulce Verdolaga Yuyo	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus dibiis</i>	4	7	0.5

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos



130mm

130mm