



26 x 15 cms

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"Este producto puede ser mortal si se ingiere". Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Causa irritación moderada a los ojos.

"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarilla y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón".

"ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE".

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN".

"NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES".

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

Evitar contacto con la piel y la ropa.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Glyphosate: organophosphate herbicide. Phosphonoglycine herbicide.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta".

"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón".

"EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VÓMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA".

Teléfonos de Emergencia: SAMU: 106; CISPROQUIM: 0800-50-847; Syngenta Perú (1) 434-5600

No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después

de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en

la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.

Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la

autoridad competente, para su gestión."

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

"Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre". No permitir animales en el área tratada. Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.

"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos". Para la protección de flora terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. No permita que la deriva de la aplicación alcance fuentes de agua. Para aplicación terrestre respete la franja de seguridad de 5 metros con relación a cuerpos de agua.

No lave o enjuague el equipo de aplicación cerca de árboles u otras plantas con raíces extendidas, o en situaciones en las que por el movimiento del suelo o por filtración, estas plantas puedan entrar en contacto con el herbicida.

"En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin".



TP 03 23 REC



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy tóxico para organismos acuáticos



TOUCHDOWN® PRO 480 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA**Concentrado Soluble (SL)**

COMPOSICIÓN

Glifosato en forma de sal de amonio* 480 g/l

*Ecuivalente a 360 g de N-(phosphonomethyl) glycine por litro de formulación a 20°C.

Aditivos: c.s.p. 1 litro

AQUA No:

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A.

Sucursal del Perú

Manuel Olguín 335 Of. 808,

Urb. Los Granados

Santiago de Surco, Lima - Perú

Teléfono: 434-5600

Formulado por:

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical Limited Liability Co., Ltd. - China

Importado y Distribuido por:

TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.

Calle René Descartes No 311

Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.

Lima - Perú.

Teléfono: 612-6565, Fax: 348-1020

R.U.C N° 20307150981

Lote No.:**Fecha de Formulación:****Fecha de Vencimiento:****Contenido Neto: 1 L**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: Glifosato pertenece al Grupo 9 de la clasificación por modo de acción de los herbicidas de HRAC. Es un herbicida sistémico, absorbido por el follaje, con rápida translocación por la planta. Inactivado en contacto con el suelo. Inhibe la 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS), evitando la síntesis de aminoácidos aromáticos esenciales necesarios para la síntesis de proteínas.

MODO DE EMPLEO: Usar equipo terrestre que cuente con boquillas adecuadas. Se debe calibrar el equipo y el ritmo de aplicación.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	MALEZAS A CONTROLAR	DOSIS (l/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
Café ¹ (Coffea arabica)	Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>), Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>), Cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>), Oreja de ratón (<i>Commelina diffusa</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Yuyo (<i>Amaranthus spinosus</i>)			1.0
Mandarina ² (Citrus reticulata)	Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>), Capulí cimarrón (<i>Nicandra physalodes</i>), Hierba de gallinazo (<i>Chenopodium murale</i>), Grama (<i>Leptochloa uninervis</i>), Chapatolla (<i>Echinochloa sp.</i>), Pata de gallina (<i>Eileusine indica</i>)	3 - 5	30	0.5
Palma ² (Elaeis guineensis)	Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>), Grama (<i>Leptochloa uninervis</i>), Hierba de gallinazo (<i>Chenopodium murale</i>), Pajilla (<i>Chloris sp.</i>), Pata de gallina (<i>Eileusine indica</i>), Rabo de zorro (<i>Setaria sp.</i>)			0.1
Palto ² (Persea americana)	Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>), Grama dulce (<i>Cynodon dactylon</i>), Yuyo (<i>Amaranthus dubius</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Lechera (<i>Euphorbia hirta</i>)	3 - 6		0.2

PC: Período de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos Gasto de agua: ¹ 300 l/ha, ² 200 - 300 l/ha
Para cultivos de exportación dar aplicación a los requerimientos exigibles según el país de destino.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar sobre malezas en activo crecimiento, de preferencia cuando son pequeñas (2 - 4 hojas) y tengan una altura inferior a 15 cm. La aplicación debe ser dirigida alrededor de las plantas de cultivo, debajo de la copa. Realizar 1 aplicación por campaña / año.

MANEJO DE RESISTENCIA: El uso repetido de herbicidas con el mismo modo de acción puede conducir bajo ciertas condiciones a una selección de malezas resistentes. Incluir Touchdown® Pro 480 SL en un programa de manejo de malezas, con productos de diferente modo de acción. Ciertas prácticas agronómicas pueden reducir la posibilidad de que se desarrollen poblaciones de malezas resistentes y se conoce que estrategias integradas son eficaces para el manejo de malezas.

PERÍODO DE REENTRADA (REINGRESO): 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No se conocen incompatibilidades; sin embargo, antes de mezclarlo con otro producto se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

FITOTOXICIDAD: Es un herbicida NO selectivo. No aplicar sobre plantas que no sean objetivo de control. El aplicador es responsable de evitar que la deriva de aplicación salga del área a tratar. No aplique bajo condiciones climáticas o con equipos de aplicación que favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas (plantas o cultivos susceptibles).

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Los miembros del producto que contienen 8 o 7 y el logo de Syngenta son marcas comerciales de una compañía del Grupo Syngenta

**ATENCIÓN**

6 pts

6 pts

6 pts