



26 x 15 cms

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evitar contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos. Causa irritación a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: fosfonglicina.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua fresca.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106; CISPROQUIM: 0800-50-847; Syngenta Perú: (1)434-5600

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión."
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

TP 07 24 REG 11

TOUCHDOWN® PRO 480 SL

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN

Glifosato en forma de sal de amonio* 480 g/l
*Equivalente a 360 g de N-(phosphonomethyl) glycine por litro de formulación a 20°C.
Aditivos: c.s.p. 1 litro

Reg. PQUA N° 3347-SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A.
Sucursal del Perú
Manuel Olguín 335 Of. 808,
Urb. Los Granados
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: 434-5600

Formulado por:

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical Limited Liability Co., Ltd. - China

Importado y Distribuido por:



TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima-Perú.
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Logo No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 L

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: Glifosato pertenece al Grupo 9 de la clasificación por modo de acción de los herbicidas de HRAC. Es un herbicida sistémico, absorbido por el follaje, con rápida translocación por la planta. Inactivado en contacto con el suelo. Inhibe la 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS), evitando la síntesis de aminoácidos aromáticos esenciales necesarios para la síntesis de proteínas.

MODO DE EMPLEO: Usar equipo terrestre que cuente con boquillas adecuadas. Se debe calibrar el equipo y el ritmo de aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA: El uso repetido de herbicidas con el mismo modo de acción puede conducir bajo ciertas condiciones a una selección de malezas resistentes. Incluir Touchdown® Pro 480 SL en un programa de manejo de malezas, con productos de diferente modo de acción.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (l/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Café¹ (Coffea arabica)	Amor seco	Bidens pilosa	3 - 5	30	1.0
	Coquito	Cyperus rotundus			
	Cadillo	Cenchrus echinatus			
	Oreja de ratón	Commelina diffusa			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Yujo	Amaranthus spinosus			
Mandarina¹ (Citrus reticulata)	Coquito	Cyperus rotundus	3 - 5	30	0.5
	Capuli cimarrón	Nicanra physalodes			
	Hierba de gallinazo	Chenopodium murale			
	Grama	Leptochloa uniuervia			
	Chapatolla	Echinochloa sp			
	Pata de gallina	Eleusine indica			
Palma² (Elaeis guineensis)	Coquito	Cyperus rotundus	3 - 6	30	0.2
	Grama	Leptochloa uniuervia			
	Hierba de gallinazo	Chenopodium murale			
	Pajilla	Chloris sp.			
	Pata de gallina	Eleusine indica			
	Rabo de zorro	Setaria sp.			
Palto² (Persea americana)	Coquito	Cyperus rotundus	3 - 5	N.A.	N.A.
	Grama dulce	Cynodon dactylon			
	Yujo	Amaranthus dubius			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Lechera	Euphorbia hirta			
	Coquito	Cyperus rotundus			
Barbecho, pre siembra²	Amor seco	Bidens pilosa	3 - 5	N.A.	N.A.
	Pata de gallina	Eleusine indica			
	Yujo	Amaranthus hybridus			
	Capuli cimarrón	Nicanra physalodes			
	Yujo	Amaranthus dubius			
	Cadillo	Cenchrus echinatus			
	Hierba de gallinazo	Chenopodium murale			
	Grama china	Sorghum halepense			
	Albahaca silvestre	Galinsoga parviflora			
	Grama dulce	Cynodon dactylon			

PC: Período de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos Gasto de agua: ¹ 300 l/ha, ² 200 - 300l/ha NA: No aplica
Para cultivos de exportación dar aplicación a los requerimientos exigibles según el país de destino.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar sobre malezas en activo crecimiento, de preferencia cuando son pequeñas (2 - 4 hojas) y tengan una altura inferior a 15 cm. La aplicación debe ser dirigida alrededor de las plantas de cultivo, debajo de la copa. Realizar 1 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REENTRADA (REINGRESO): 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No se conocen incompatibilidades; sin embargo, antes de mezclarlo con otro producto se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo la dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORIA TOXICOLOGICA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO

