

VEDANCHA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Cymoxanil	50 g/kg
Dimethomorph:.....	300 g/kg
Aditivos.....	c.s.p. l/kg



SANVEG PERÚ S.A.C.

MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL

NOCIVO SI SE INHALA

CAUSA IRRITACIÓN MODERADA EN LOS OJOS



PELIGRO

[illegible][illegible]

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresarse al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
KERACHA 350 WPes compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes, ácidos, alcalinos y cobre, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las

CULTIVO	PAPA
---------	------

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (dias)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PAPA	"Rancha"	<i>Phytophthora infestans</i>	g/200 L kg/ha -	14	0,01 ^a 0,05 ^b

PC: Período de Carencia. LMR: Límite Máximo de Residuos, a: Cymoxanil; b: Dimethomorph

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA N°4:
LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO**

