


13.17 cm

2.33 cm



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con agua fría.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y bríndele una posición confortable para respirar.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
Teléf. del titular: **L&M Servicios Agrícolas Integrales SAC: (01) 382 - 4874**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Moderadamente tóxico para peces.
- Ligeramente toxico para abejas.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No lave los equipos de aplicación en cuerpos de agua como lagos, ríos, acequias, etc.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en época de floración ni cuando exista presencia de abejas y otros polinizadores en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PROGRANIC[®] GAMMA

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Extracto de ajo 25% p/p

Extracto de ají 25% p/p

Extracto de canela 10% p/p

Aditivos csp 100% p/p

Reg. N° 0203-SENASA-PBA-EV

Titular de Registro:
L&M Servicios Agrícolas Integrales S.A.C.
Av. Javier Prado Este N°488 Piso 9
San Isidro, 15046 Lima, Perú
Teléfono: +51 (01) 382 - 4874
www.seragro.net

Formulador:
Ultraquimia Agrícola S.A. de C.V.
Indiana No. 260-604. Col. Ciudad de los Deportes.
Benito Juárez, Ciudad de México, México. CP 03710.
Teléfono: +52 55-55988034
www.ultraquimia.com

Importador y distribuidor:
BIOTECNAGRO SAC.
Av. Chacra Cerro Mz C LT. 97 A Ex Fundo Trapiche,
Comas, Lima, Perú
Teléfono: +51 997 602 935
rsarolli@biotecnagro.com

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 200 L

Ultraquimia Agrícola S.A. de C.V.

Biotechnagro



Ultraquimia Agrícola S.A. de C.V.



Biotechnagro

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
PROGRANIC GAMMA[®], es un insecticida biológico. Los compuestos del producto emiten una señal inequívoca para el insecto que le dificulta encontrar su fuente de alimento; provoca repelencia, excitación del sistema nervioso y efecto irritante, dificultando el vuelo y la ovoposición de los insectos. Su olor causa desorientación durante la etapa de reproducción y obstruye la acción de las feromonas sexuales.

Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia de pH 6.5-7.5 hasta la mitad y luego añada el producto a la dosis recomendada revolviendo constantemente; completar el volumen con agua. Aplicar inmediatamente después de preparar la mezcla.

PROGRANIC GAMMA puede ser aplicado durante todo el ciclo de cultivo. Procure que el producto tenga contacto con los insectos, que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan la cobertura de sitios donde se localizan las plagas. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		(L/cil)	LMR (ppm)	PC (días)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arándano	Mosca Blanca	Aleurodicus juleikae	2.0 - 3.0	N.A.	N.A.

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de Carenia N.A: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación y ante la presencia de la plaga.
- Se recomienda 3 aplicaciones por campaña, considerando un intervalo de 7 días.
- No aplicar en floración.

PERIODO DE REINGRESO
No reingresar al campo, hasta después de 12 horas de haber aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
PROGRANIC GAMMA[®], no es compatible con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
PRECAUCION

